

中国古医籍整理丛书

伤寒金匱
22

国家中医药管理局

中医药古籍保护与利用能力建设项目

伤寒正医录

清·邵成平 撰
邱若虹 校注



中国古医籍整理丛书

伤寒正医录

清·邵成平 撰

邸若虹 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒正医录 / (清) 邵成平撰; 邸若虹校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 3032 - 2

I. ①伤… II. ①邵… ②邸… III. ①《伤寒论》—研究
IV. ①R222. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 310284 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710 × 1000 1/16 印张 18.25 字数 133 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 3032 - 2

*

定价 55.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博

委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

（山东省）武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

（江苏省）吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡 烈

（上海市）张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

（福建省）阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

（浙江省）徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

（陕西省）黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

（河南省）夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

（辽宁省）杨关林 康廷国 石 岩 李德新

（四川省）杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国（山东省） 王旭东（江苏省） 张如青（上海市）

李灿东（福建省） 陈勇毅（浙江省） 焦振廉（陕西省）

蔡永敏（河南省） 鞠宝兆（辽宁省） 和中浚（四川省）

项目专家组

顾问	马继兴	张灿珥	李经纬		
组长	余瀛鳌				
成员	李致忠	钱超尘	段逸山	严世芸	鲁兆麟
	郑金生	林端宜	欧阳兵	高文柱	柳长华
	王振国	王旭东	崔 蒙	严季澜	黄龙祥
	陈勇毅	张志清			

项目办公室（组织工作委员会办公室）

主任	王振国	王思成			
副主任	王振宇	刘群峰	陈榕虎	杨振宁	朱毓梅
	刘更生	华中健			
成员	陈丽娜	邱 岳	王 庆	王 鹏	王春燕
	郭瑞华	宋咏梅	周 扬	范 磊	张永泰
	罗海鹰	王 爽	王 捷	贺晓路	熊智波
秘书	张丰聪				

前言

中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批200余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及

“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003～2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匱、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定

了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识 and 人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月

许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。

今又有“六地、七种、八种、九种”之目称，集九省之大成，共六万钱，重达二斤，且其书，达400余种，凡中土之基、土、地、物、人、事、理、义、各有所在，凡经国治、作事、事、俱涵盖之。

然其言分世之隆[与]也！自今而后，[吾]所[与]交[者]，在[先]王[之]后，[乃]未[可]不[求]也，[吾]之[意]，[今]以[已]上[不]言[转]授[于][卿]相[既]蜂[出]矣，余[则]有[望]于[来]者。

譯序

第九届、十届全国人大常委会副委员长

許嘉瑛

二〇一四年冬

目 序

中国是一个多民族国家，各民族在悠久的历史中，在伟大的事业中，共同创造了灿烂的文明，共同开拓了辽阔的疆域，共同谱写了辉煌的篇章。中国是一个统一的多民族国家，各民族在长期的历史进程中，共同创造了灿烂的文明，共同开拓了辽阔的疆域，共同谱写了辉煌的篇章。中国是一个统一的多民族国家，各民族在长期的历史进程中，共同创造了灿烂的文明，共同开拓了辽阔的疆域，共同谱写了辉煌的篇章。

中国是一个多民族国家，各民族在悠久的历史中，在伟大的事业中，共同创造了灿烂的文明，共同开拓了辽阔的疆域，共同谱写了辉煌的篇章。中国是一个统一的多民族国家，各民族在长期的历史进程中，共同创造了灿烂的文明，共同开拓了辽阔的疆域，共同谱写了辉煌的篇章。中国是一个统一的多民族国家，各民族在长期的历史进程中，共同创造了灿烂的文明，共同开拓了辽阔的疆域，共同谱写了辉煌的篇章。

2010年1月，中共中央、国务院印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，这是新中国成立以来第一部专门就教育问题作出战略部署、具有纲领性、全局性、战略性意义的文件。

能力主取民间，这就是继承中，为了发展，也是弘扬优秀
民族文化的唯一途径，不仅能够全面继承中华医药宝贵知识和
创制经验，为守护人民健康做出更大贡献，也是大力弘扬中华医药
独特文化，为筑建中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

我们相信，随着《条例》的颁布实施，必将为继承和弘扬中

国家卫生与计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王树强

二〇一四年十二月

校注说明

[illegible]

卷八为霍乱、吐衄、泄利、痢疾、伤寒、杂病；
卷九为劳复、食复、阴阳易、痉病、湿病、喝病、暑病、霍
乱、疟、痢；卷十为春温、夏热、发斑、疫、火劫、狐惑

本书各书图，不仅对寸口脉诊，而且对全身脉诊，都有详述，而且多能图文、图说并茂。如《内经》卷二及卷三寸口各部脉诊图，以寸口脉分为三部，每部又分三部；右寸为心部，左寸为肝部；右关为脾部，左关为肝部，右尺为肺部，左尺为肾部，右前为肠胃及大肠，左尺为肾及膀胱。其各部及小部各部脉对人一身各部对应关系，与《内经》所载左寸心、小肠，右寸肺、大肠之说不尽相同。又如，关于“三部”之概念，以寸部为上部，“关部”为中部，尺部为

[illegible]

- 1) 蔑：蔑，无。
- 2) 伊耆：即指神农。
- 3) 几几：几乎，几许。
- 4) 易水：指张元素。金代医家，字洁古，著有《医学启原》等。
- 5) 金华：指朱丹溪。元代医家，名震亨，字彦修，著有《丹溪心法》。
- 6) 覈 (kuò 款) 会：关键。

目 录

卷 一

伤寒论总论	一
太阳病	二
阳明病	三
少阳病	四
太阴病	五
少阴病	六
厥阴病	七
正伤寒五条	一三
温热暑湿病十条	一三
类伤寒六症	一四
伤寒传经	一五
伤寒六经	一六
传足不传手辨	一八
伤寒治法总	一八
伤寒无补法辨五条	二〇
饿不死伤寒辨	二一
阴阳辨	二二
伤寒	二三
伤寒	二四

伤寒	二五
伤寒	二六
伤寒	二七
伤寒	二八
伤寒	二九
伤寒	三〇
伤寒	三一
伤寒	三二
伤寒	三三
伤寒	三四
伤寒	三五
伤寒	三六
伤寒	三七
伤寒	三八
伤寒	三九
伤寒	四〇
伤寒	四一
伤寒	四二
伤寒	四三
伤寒	四四
伤寒	四五
伤寒	四六
伤寒	四七
伤寒	四八
伤寒	四九
伤寒	五〇
伤寒	五一
伤寒	五二
伤寒	五三
伤寒	五四
伤寒	五五
伤寒	五六
伤寒	五七
伤寒	五八
伤寒	五九
伤寒	六〇
伤寒	六一
伤寒	六二
伤寒	六三
伤寒	六四
伤寒	六五
伤寒	六六
伤寒	六七
伤寒	六八
伤寒	六九
伤寒	七〇
伤寒	七一
伤寒	七二
伤寒	七三
伤寒	七四
伤寒	七五
伤寒	七六
伤寒	七七
伤寒	七八
伤寒	七九
伤寒	八〇
伤寒	八一
伤寒	八二
伤寒	八三
伤寒	八四
伤寒	八五
伤寒	八六
伤寒	八七
伤寒	八八
伤寒	八九
伤寒	九〇
伤寒	九一
伤寒	九二
伤寒	九三
伤寒	九四
伤寒	九五
伤寒	九六
伤寒	九七
伤寒	九八
伤寒	九九
伤寒	一〇〇

厥初中篇 七

厥阴卜篇 一八四

卷 九

差后劳复 食复 女劳复 阴

..... 一八八

..... 七

..... 七

..... 七

..... 一八

.....

.....

.....

.....

卷 十

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

此条开卷，愿学者熟读深思，为人德¹之门焉。

脉 总

三部九候

帝曰：何以知病之所在？岐伯曰：察九候，独小者病，独大者病，独疾者病，独迟者病，独热者病，独寒者病，独陷者病。

寸关尺三部，寸为阳，为上部，主头项至心胸之分也。关为阴阳之分，主中脘之分也。尺为阴，为下部，主腰足胫股之分也，三部各有浮、中、沉三候。如浮主皮毛，中主肌肉，沉主筋骨，此谓三部九候。

左寸，心部也，候心与心包络，得南方君火之气，脾土受生，肺金受制。

右寸，肺部也，候肺与膻中，得西方燥金之气，肾水受生，肝木受制。王叔和分左寸心小肠、右寸肺大肠之说，非是，盖大小肠，宜在尺部候之，第谓表里相通可耳。

左关，肝部也，候肝胆，得东方风木之气，心火受生，脾土受制。

右关，脾部也，候脾胃，得中央湿土之气，肺金受生，肾水受制。

左尺，肾部也，候肾与膀胱大肠，得北方寒水之气，肝木受生，心火受制。

右尺，三焦部也，候肾与三焦命门小肠。得北方天一相火

1 人德：进入圣人品也。嵇康撰。

数脉，五至六至，凡急、疾、紧、促者皆是。《难经》曰：脉至数而急者，谓之阳盛，脉至数而迟者，谓之阴盛。脉至数而滑者，谓之阳盛，脉至数而涩者，谓之阴盛。脉至数而弦者，谓之肝盛，脉至数而沉者，谓之肾盛。脉至数而浮者，谓之心盛，脉至数而洪者，谓之脾盛。脉至数而微者，谓之肺盛。脉至数而细者，谓之胆盛。脉至数而短者，谓之胃盛。脉至数而长者，谓之大肠盛。脉至数而促者，谓之小肠盛。脉至数而紧者，谓之膀胱盛。脉至数而缓者，谓之三焦盛。脉至数而沉者，谓之肾盛。脉至数而浮者，谓之心盛。脉至数而洪者，谓之脾盛。脉至数而微者，谓之肺盛。脉至数而细者，谓之胆盛。脉至数而短者，谓之胃盛。脉至数而长者，谓之大肠盛。脉至数而促者，谓之小肠盛。脉至数而紧者，谓之膀胱盛。脉至数而缓者，谓之三焦盛。

脉至数而洪大者，为阳实、阴虚、气虚之症，若洪大之极，至四倍以上者，即阴阳关格之脉，不可治。

微脉，属阴，纤细无神，与细、小、虚、濡相类，乃气血俱虚之候，为少气，为中寒，为恐惧，为怯弱，为畏寒，为脉微，为亡阳，为亡阴，为亡气，为亡血，为亡精，为亡神，为亡魂，为亡魄，为亡志，为亡意，为亡思，为亡虑，为亡智，为亡慧，为亡德，为亡行，为亡言，为亡动，为亡静，为亡生，为亡死。

滑脉，往来流利，凡洪、大、紧、实皆其类也，乃气实血壅之候，为痰，为食，为呕吐，为满闷。滑大、滑数为内热，上为心、肺、头、目、咽喉之热，下为小肠、膀胱、二便之热。人弦滑者，为肝盛，人弦滑者，为胆盛，人弦滑者，为胃盛，人弦滑者，为脾盛，人弦滑者，为肺盛，人弦滑者，为大肠盛，人弦滑者，为小肠盛，人弦滑者，为膀胱盛，人弦滑者，为三焦盛。多弦滑，此脾肾受伤也，不可作火治。

脉至数而沉者，谓之肾盛。脉至数而浮者，谓之心盛。脉至数而洪者，谓之脾盛。脉至数而微者，谓之肺盛。脉至数而细者，谓之胆盛。脉至数而短者，谓之胃盛。脉至数而长者，谓之大肠盛。脉至数而促者，谓之小肠盛。脉至数而紧者，谓之膀胱盛。脉至数而缓者，谓之三焦盛。

作。旧按宜熟复。

黑色少退者可治，坚不退者不可治。

[illegible][illegible]

D 留都：古代帝都新迁后，于旧都常设官留守，行其政事，称留都。此处“留都”指南京。

补，汗者，治在表也。而汗法有三：一曰温散。寒胜之时，阳
 气内陷，治在表也。二曰温补。阳虚之时，治在里也。三曰温
 散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。汗法有三：一曰温散。寒
 胜之时，阳气内陷，治在表也。二曰温补。阳虚之时，治在里也。
 三曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。汗法有三：一曰温
 散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。二曰温补。阳虚之时，治
 在里也。三曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。汗法有
 三：一曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。二曰温补。阳
 虚之时，治在里也。三曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表
 也。汗法有三：一曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。二
 曰温补。阳虚之时，治在里也。三曰温散。寒胜之时，阳气内
 陷，治在表也。汗法有三：一曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治
 在表也。二曰温补。阳虚之时，治在里也。三曰温散。寒胜之
 时，阳气内陷，治在表也。汗法有三：一曰温散。寒胜之时，阳
 气内陷，治在表也。二曰温补。阳虚之时，治在里也。三曰温散
 。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。汗法有三：一曰温散。寒胜
 之时，阳气内陷，治在表也。二曰温补。阳虚之时，治在里也。三
 曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。汗法有三：一曰温散
 。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。二曰温补。阳虚之时，治在
 里也。三曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。汗法有三：一
 曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。二曰温补。阳虚之时
 ，治在里也。三曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。汗法
 有三：一曰温散。寒胜之时，阳气内陷，治在表也。二曰温补。

① 该：通“贱”。郑玄《论语集解义疏》：“此书既揭该众典以
 教一切。”

麻黄附子细辛汤。

少阴脉沉，始得之，反发热，似太阳症矣，实不同者，其热不翕翕然，症无头疼，须甘草干姜附子汤。

太阳脉浮，与太阳相似，同一伤寒，太阳脉浮，身重，则渴，太阳手足温，少阴手足厥也。

太阳脉浮，与太阳相似，同一伤寒，太阳脉浮，身重，不恶风寒而渴也，太阳脉浮紧，疼则脉沉细也。

太阳脉浮，与太阳相似，同一伤寒，太阳脉浮，身重，不恶风寒而渴也，太阳脉浮紧，疼则脉沉细也。中湿与疼更有别者，湿则身疼，疼则身不疼。

太阳脉浮，与太阳相似，同一伤寒，太阳脉浮，身重，不恶风寒而渴也，太阳脉浮紧，疼则脉沉细也。

太阳中风见寒脉，用大青龙，与太阳伤寒相似，所不同者，有烦躁也，麻黄症则无烦躁。

太阳伤寒见风脉，用大青龙，与中寒湿相似，有不同者，伤寒脉浮缓，寒湿脉沉细也。

太阳脉浮，与太阳相似，同一伤寒，太阳脉浮，身重，不恶风寒而渴也，太阳脉浮紧，疼则脉沉细也。或有与小柴胡症相似者，终无半表里为异耳。

太阳脉浮，与太阳相似，同一伤寒，太阳脉浮，身重，不恶风寒而渴也，太阳脉浮紧，疼则脉沉细也。

《活人》云：病人脉浮而大，是表症，当汗。若发热烦躁，小便赤，却当下。此是表里俱见，五苓散主之。

伤寒六七日，不大便，头痛有热，是里症，当下。若小便赤，却当下。此是表里俱见，五苓散主之。

人热入血室亦用。此小柴胡之通变也。

从症不从脉

脉浮宜汗。若浮大，心下硬，有热者，属脏，攻之。

小柴胡汤在表证未解，反见里证，用之，并加芍药，以汤汗之。盖熟附配麻黄，发中有补也。

脉促宜清。若促而厥冷，为虚脱，温之。

脉迟宜温。若阳明脉迟，濈濈汗出，承气下之。

从脉不从症

表症宜汗。然发热头痛，脉反沉，身疼，用四逆汤。

里症宜下。日晡发热属阳明，若脉浮虚者，桂枝汗之。

结胸宜下。然脉浮大者，下之必死，当治其表。

身痛宜解表。然尺迟勿汗，血不足也，当调其营。

太阳病，脉当浮，今不浮而反沉者，里必虚寒，身虽痛，不可发汗，当温之。桂枝汤加芍药，以和营，干姜，补中有发也。

汗吐下温八条¹

可汗

太阳病，脉浮者，当汗。太阳病，脉浮而发热，欲

1 八条：原书为“九条”，据下文改。

脉多者，邪气实也，脉弱者，正气虚也。凡老人及产后，脉虚软，干呕，皆禁吐。

可温 不可温

太阳病，脉浮而紧，发热恶寒者，不可发汗，发汗则亡阳。阳明病，脉洪大，身大热，反欲得冷饮者，不可温之。少阴病，脉微细，身大寒，反欲得热饮者，不可温之。凡脉数而有力，并不可温。

愈 证

太阳病，巳至未解。阳明病，申至戌解。少阳病，寅至辰解。太阴病，巳至未解。厥阴病，子至寅解。凡六经各于所生之时而解。经曰：自得其位而起者是也。

凡病者，必先察其脉，脉浮者，欲汗也。脉沉者，欲下也。脉数者，欲清也。脉迟者，欲温也。脉弦者，欲舒也。脉滑者，欲和也。凡此皆愈证也。

脉浮数而微，病人身温和者，欲解也。

凡病人反能饮水者，为欲愈。

太阴中风，脉阳微阴涩而长者，为欲愈。

少阴中风，脉阳微阴浮者，欲愈。

厥阴中风，脉微浮者，将愈，不浮未愈。

问曰：病有战而汗出者，因得解，何也？答曰：脉浮而紧，身大寒者，欲战也。战而汗出，病即解也。

凡脉浮而数，按之不扎，其人本不虚，若欲自解，但汗出耳，不发战也。

凡病者，必先察其脉，脉浮者，欲汗也。脉沉者，欲下也。脉数者，欲清也。脉迟者，欲温也。脉弦者，欲舒也。脉滑者，欲和也。凡此皆愈证也。

故不战不汗而解

凡日中得病，夜半愈者，以阳得阴则解也。夜半得病，日中愈者，以阴得阳则解也

死 证

诸症见阴脉者死。阴阳毒过六七日者死。脉浮而滑，汗出如油，水浆不入，喘不休，身不仁者死。喘逆上气，脉散者死。阳反独留，体如烟熏，直视摇头，心绝。汗出，发润而喘，肺绝。唇吻反青，四肢汗出，肝绝。环口赭黑，虚寒发黄，脾绝。脉紧盛，汗出不解者死。尺寸俱虚，热不止者死。身热喘急，脉阳而躁者死。大发湿家汗，则痒者死，热而痒者死。发少阳汗则谵语，少阴汗则动血，谓之上厥下竭者死。发湿温汗，口舌干者死。汗后不为汗衰，谓之阴阳交者死。不得汗者死。发动气汗者死。发热，脉躁疾，狂言，不能食，谓之三死。结胸症，脉浮大者，不可下，下之则死。结胸症具，烦躁者死。肝结者死。少阴泄利，烦躁四逆者死。少阴恶寒，身蜷而利，手足逆冷者，死。七八日以上，大发热者死。

以上诸症，或病深药浅，或病浅药误，若依仲景法，而细究来因，遵方处治，未必尽不可救。其如荆、防发表，芩、栀

人... 水停，短气烦闷，茯苓甘草汤

身 重

... 四肢沉重一症，真武汤。

难转侧

三阳合病，腹痛，身难转侧，汗出者，白虎汤。下后，胸... 能转侧，脉虚而涩，桂枝附子汤。

面赤 面垢 面青

... 后，发热恶寒，肤润面青，难治。

坏 病

... 病：原作“残”，据文义改。

中比... 花... 大... 小... 多...
与... 在... 者...
... 下... 九...
... 水... 及... 理中加乌梅。

蛆

... 以... 为...
... 八... 九... 不解... 一条... 麻黄汤主之一句... 应在...
... 败毒散、阳旦汤为稳。烦渴者，五苓散、竹叶石膏汤。

吐血

... 升麻鳖甲汤。少阳误汗动血，俱不治。

便脓血

... 数... 有力... 数... 有力... 数... 有力...

抽搐者，为肝绝，皆不治。

肿

《活人》云：凡人身肿，必先辨其肿在皮还是在肉。若在皮者，宜用发汗法；若在肉者，宜用利小便法。若在皮者，宜用麻黄汤；若在肉者，宜用五苓散。其效如神。

身热恶寒 身寒恶热

丹溪曰：身大热，反欲得近衣者，表气虚，不足以自温，宜用桂枝汤。身大寒，反欲得近火者，里气虚，宜用理中汤。《活人》云：热在皮肤一条，经无治法，宜先与阴旦汤，以散其邪。寒在皮肤一条，经亦无治法，宜先以白虎人参汤除热，以和其里。其效如神。

百 合

百合病者，无分经络，百脉一宗，悉致病也。人常默默然，欲卧不能卧，欲行不能行，饮食无味，口苦，小便不利，即吐利，状如神灵。每溺时头痛者，六十日愈。溺时头不痛，渐渐然者，四十日愈。溺时快然但头眩者，二十日愈。

《活人》云：多因伤寒大病之后，变成奇疾也。大病者如

漆黑。

百合知母汤 治发汗后。

百合七枚，擘 知母二两，切

先将百合水浸一宿，滤干，更以井水二杯，煎一杯，去渣，以汁煮知母，取汁一升，和百合汁，分温再服。

滑石代赭汤 治下后。

百合七枚，擘 滑石二两，绵包 代赭石弹子大，打碎，绵包

百合七枚，擘，滑石二两，绵包，代赭石弹子大，打碎，绵包，合煎一盞，分温再服

百合鸡子汤 治吐后。

百合七枚，擘 鸡子黄一枚

将百合浸煎如前，取汁一升，入鸡子黄搅匀，再煎至五分，服

百合地黄汤 治不经汗吐下者。

百合七枚，擘 地黄一斤

浸煎百合如前，另煎地黄汁一杯，和匀再煎，分温服。中病止后服

百合滑石散 治发热者。

百合二两 滑石二两

共为末，饮服方寸匕，日三服。微利热止，勿再服。

瓜蒌牡蛎散 治渴不瘥者

瓜蒌根 牡蛎

等分，为末，饮服方寸匕，日三服。

百合散 治一月不解，变成渴疾。

百合 瓜蒌根各二两 牡蛎煅，研粉 麦冬去心 山梔炒，各七

钱半 甘草五钱

上吹咀，每服五钱，人生姜一钱，竹叶七片，水煎服。

渴者用百合一两，炒黄为末，每服二钱，米汤下。又用百合一升，水一斗，渍一宿，洗身，洗已食饼，勿用盐豉。

阳常有余，故六日虽遍六经，至七日而解。阴常不足，故六日遍六经而即解。

太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

经云：尺寸俱浮者，太阳受病。太阳之脉络头下，项强痛者，表邪上之也。恶寒，该恶风而言。此条举太阳之总病，以应前文。至下条，又云：脉浮而恶寒者，发之，汗出，表未解。

伤寒一日，太阳受之，若脉静者，为不传。欲吐者，若烦躁，脉急数者，为传也。

脉静者，太阳自和，故知不传。欲吐者，即少阴之欲吐不吐，故知传也。烦躁，脉急数者，即阳明之证也。此条举太阳之传经，以应前文。

伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。

不传而竟自愈者，有之。不传而未解，留太阳一经者，有之。

风伤卫

太阳病，发热，汗出，恶风，脉浮者，名为中风。

中风者，卫气在卫而营气在里，故曰卫强营弱。卫强者，卫气浮于外，故曰脉浮。营弱者，营气在里，故曰汗出恶风。此条举太阳中风之证，以应前文。至下条，又云：太阳病，发热，恶寒，脉浮者，发之，汗出，恶寒者，解缓故也。

1) 浮：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》无“浮”字。

差，下甲弊謬矣。

按：伤卫伤营全在有汗无汗，分别详明，法极应验，有谓麻黄、桂枝，长沙专治冬月正伤寒，不宜春夏者，其说作俑于宋人，狂吠于陶节庵，不知有医中之圣者久矣。忆予先君子曾暑月乘凉，冒风发热，头痛汗出而脉浮缓，时年八十有四矣，若信里中名匠，用羌、防发表，加香薷、藿香，为风暑兼顾恰当之法，岂不大误？幸我友翁子瞻溪，竟进以桂枝汤，一剂而汗止热退，其病如失。夏月之桂枝不禁，则麻黄亦不可因证而施乎？予用是大声疾呼，谓仲景书不可不读，仲景法不可不遵，以正千百年相传之误。

大阳病、发热汗出者，此为太阳中风，故使桂枝汤。欲发邪风者，宜桂枝汤主之。

非血虚之谓也

病常自汗出者，此为营气和，营气和者，外不固，以卫气不与营气和故耳。以营行脉中，卫行脉外。复发其汗，营卫和则愈，宜桂枝汤。

营不受病，故曰和。卫自受风，汗出，故曰不共营气和。此叔和、李时珍、张景岳、喻昌等所传也。然此等说，当卫受风，了然心目，岂有兼用表药之理？

其人若无他病，时发汗自止而不愈者，此卫气不和也，先其时发汗则愈，宜桂枝汤主之。

[illegible]

五苓散

猪苓 茯苓 白术各十八铢，每铢一分三厘八毫 泽泻一两六铢

半¹ 桂半两

五味为末，以白饮和服方寸匕，日一服。

太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若身浮者，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。

此散治太阳病发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若身浮者，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。此散治太阳病发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若身浮者，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。

发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。

浮数，表未去也，烦渴，里热也，仍用两解法，

微在里，当以干姜之，反以冷水灌之解之，其热破功不得去，若更重厚，则上壅也，当欲饮水，反不得者，散文蛤散若不差者，与五苓散。

此散治太阳病发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若身浮者，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。

文蛤散

文蛤五两

一味为散，以沸水合，和一钱匕服

身热，反欲得饮，欲引水且逆，若以水灌之，则之，皆令

¹ 一两六铢半；《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“一两六铢”

热不得出，当汗而不汗，则邪不解。假令汗已出，腹中痛，与芍药三两，如上法。

伤寒中风，下利，脉沉弦者，此属里证。若反汗出，乃表证也。当以桂枝汤发之。若下利，脉沉弦者，此属里证。若反汗出，乃表证也。当以桂枝汤发之。若下利，脉沉弦者，此属里证。若反汗出，乃表证也。当以桂枝汤发之。

发汗后，水乃不得入口者，若更发汗，必吐下不止。

言发汗者，不宜汗而误汗者也。其人素有痰饮，津液亡而水饮愈逆，上吐而下泄，肺与大肠为表里也。

伤寒汗出而喘者，不可散之。一不汗者，茯苓甘草汤主之。

汗出，中风证也。渴者，热入膀胱。气不化而水道不出，故汗出而渴。若汗出而渴者，宜与五苓散。若汗出而渴者，宜与五苓散。故桂枝汤去芍药，加茯苓，而使内外俱解也。

茯苓甘草汤

桂枝 茯苓 甘草²各二两 生姜一两

水四升，煮二升，分三服。

太阳病，小便利者，以饮水多，心下悸。小便少者，必苦里急也。

饮水多而小便利，必水不内蓄，但阳邪未散，水停心下，故心悸也。小便少者，邪热在内而消水，故云里急。

太阳病，已发汗，若下，若汗，若下，若汗，仍不解者，

1 益令热不得出：《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“益令热却不得出”。

2 甘草：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》作“炙甘草一两”。

水六升，煮三升，适寒温，服一升。若一服汗止，停后服。

发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药汤¹。姜各一两人参三两新加汤主之。

发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药汤¹。姜各一两人参三两新加汤主之。发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药汤¹。姜各一两人参三两新加汤主之。发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药汤¹。姜各一两人参三两新加汤主之。

新加汤

桂枝 人参各二两 芍药酒洗 生姜各四两 炙甘草二两 大枣十二枚

水七升，煮三升，服一升。

发汗后，脉沉迟者，厚朴生姜甘草人参汤主之。

厚朴生姜甘草人参汤。

厚朴去皮，炒 生姜 半夏¹制，各半斤 甘草炙，二两 人参二两

水一斗，煮三升，温服一升，日三。

治胀满而用朴、姜、半夏。今之纸费者，谁不摇笔便写？发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药汤¹。姜各一两人参三两新加汤主之。发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药汤¹。姜各一两人参三两新加汤主之。

发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

茯苓 桂枝 甘草 大枣 水一斗，煮三升，服一升，日三。发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药汤¹。姜各一两人参三两新加汤主之。

1 半夏：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“半夏半升，洗”。

误下之恶寒，正恐其入于阴而去之耳。

太阳病，下之微喘者，表未解也，桂枝加厚朴杏仁汤主之。

桂枝加厚朴杏仁汤

桂枝 芍药 生姜各三两 甘草炙，二两 大枣十二枚 厚朴二两 杏仁五十粒，去皮尖

水七升，煮三升，服一升后，汗出病瘳，止后服。

曰：表证，误下之，微喘，表证已下，误下下之，又桂枝加厚朴杏仁汤，此方以治下气。斟酌轻重，宜曲体其苦心。

喘家，作桂枝汤，加厚朴、杏子仁。

凡有喘者，皆宜服此汤，不特误下后也，故申言之。

太阳病，下之，不解，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有身分也。复下之，若利止，必作结胸。未止者，日复下之，此作协热利也。

太阳病，下之，利止，心下结胸，脉微者，此本有身分也。复下之，若利止，必作结胸。未止者，日复下之，此作协热利也。

太阳病，下之，利止，心下结胸，脉微者，此本有身分也。复下之，若利止，必作结胸。未止者，日复下之，此作协热利也。

曰：小兒大便，表里皆和，此方以治下气。斟酌轻重，宜曲体其苦心。

体痛者，风也。风者，浮也。浮者，在外也。用白芷者，白芷能入阳明经，入阳明经者，入于胃，胃气上通，所以能入于阳明也。此即为一证也。此即为在表，此是要诀。

太阳病，头痛，发热，身疼，恶寒，骨节疼痛，无汗，而喘者，麻黄汤主之。

太阳病者，身重，骨节疼痛，恶寒，无汗，而喘者，此即太阳病也。风者，浮也。浮者，在外也。用白芷者，白芷能入阳明经，入阳明经者，入于胃，胃气上通，所以能入于阳明也。此即为一证也。此即为在表，此是要诀。

麻黄汤

麻黄三两，去节，滚醋汤略浸片时 桂枝二两，去皮 炙甘草一两 杏仁七十粒，去皮尖

以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，分四次服。每服一升，温覆取汗，不可令汗出太多，得汗即止。此即桂枝法。

麻黄汤者，太阳病也。其证身重，骨节疼痛，恶寒，无汗，而喘者，此即太阳病也。用白芷者，白芷能入阳明经，入阳明经者，入于胃，胃气上通，所以能入于阳明也。此即为一证也。此即为在表，此是要诀。

温粉方

白术 桑白 川芎 白芷

研为细末，每末一两，入米粉三两，和匀，扑周身止汗。若汗过多，扑之即止。此即温粉方也。用白芷者，白芷能入阳明经，入阳明经者，入于胃，胃气上通，所以能入于阳明也。此即为一证也。此即为在表，此是要诀。

脉浮者，病在表，可发汗，用麻黄汤。

脉浮者，病在表，可发汗，用麻黄汤。

伤寒八九日，身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。

脉浮而数者，可发汗，用麻黄汤。

伤寒八九日，身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。

伤寒发汗解，半日许复热，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。

伤寒八九日，身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。此条与上条同，但有身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。此条与上条同，但有身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。

伤寒不大便六七日，头有热者，与承气汤。其小便清者，知不在里，仍在表也，当先发汗。若头痛者，必衄，宜桂枝汤。

六七日不大便，明是里热，故虽头痛，亦宜承气下之。特以小便利，知不在里，仍在表也，故先发汗。若头痛者，必衄，宜桂枝汤。

伤寒八九日，身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。此条与上条同，但有身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。

伤寒八九日，身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。此条与上条同，但有身大热，反欲得近衣者，不可发汗，当以温药发之。

便自汗出，乃愈。

此条与《伤寒论》中“太阳病，发汗多，亡阳者，不可下”意亦先建中之意。观此三条，可悟扶正祛邪之法。

伤寒，发汗多，亡阳者，不可下。此条与《伤寒论》中“太阳病，发汗多，亡阳者，不可下”意亦先建中之意。观此三条，可悟扶正祛邪之法。

此条与《伤寒论》中“太阳病，发汗多，亡阳者，不可下”意亦先建中之意。观此三条，可悟扶正祛邪之法。

发汗后，恶寒者，属虚也。不可下。但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。

此条与《伤寒论》中“发汗后，恶寒者，属虚也。不可下。但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。”意亦先建中之意。观此三条，可悟扶正祛邪之法。

发汗后，饮水多者必喘，以水灌之亦喘。

此条与《伤寒论》中“发汗后，饮水多者必喘，以水灌之亦喘。”意亦先建中之意。观此三条，可悟扶正祛邪之法。

咽喉干燥者，不可发汗。

少阴之脉络于喉，发汗则津液愈耗。

淋家不可发汗，发汗必便血。

此条与《伤寒论》中“淋家不可发汗，发汗必便血。”意亦先建中之意。观此三条，可悟扶正祛邪之法。

疮家，虽身疼痛，不可发汗，汗出则疮。

此条与《伤寒论》中“疮家，虽身疼痛，不可发汗，汗出则疮。”意亦先建中之意。观此三条，可悟扶正祛邪之法。

衄家不可发汗，汗出必额上陷脉紧急，目直视不能眴，不

得眠。

亡阳者，身大冷，反欲得近衣者，不可发汗，发汗则亡阳也。此言反汗而虚虚之咎，故脉紧急为正衰邪炽之象。

亡血家不可发汗，发汗则寒栗而振。

亡血者，汗血也，汗血者，亡阳也，发汗则更亡其阳，安得不现寒象乎？

汗家重发汗，必恍惚心乱，小便已，阴疼，与禹余粮丸。缺

汗为心液，心多汗必汗液虚，汗液虚则心亦虚，此心虚而阴疼也。生津养血，方虽缺而可意会。

阳虚者，不可发汗，发汗则亡阳，气欲绝，于是厥冷，欲得蜷卧，不得自温。

阳虚者，身大冷，反欲得近衣者，不可发汗，发汗则亡阳也，手足厥冷，蜷卧，皆亡阳之征也，岂能自得其温乎？

咳者小便利，若失小便者，不可发汗，发汗则因咳而冷，此言亡阳之证也。小便者，阳气之征也，若失小便，更发其汗，则亡阳矣。

诸虚者，数动微弱者，不可发汗，发汗则大便难，食中干，胃燥而烦。

诸虚者，身大冷，反欲得近衣者，不可发汗，发汗则亡阳也，此言亡阳之证也，身大冷，反欲得近衣者，皆亡阳之征也，岂能自得其温乎？

诸虚者，身大冷，反欲得近衣者，不可发汗，发汗则亡阳也。

厥逆者，已入阴分矣，而更发其汗，则言乱，为少阴，目眩，为厥阴，是谁之咎？

身大热，脉反沉，若手足冷，身疼痛，救其里，宜四逆汤。

此凭脉不凭症者也。玩“若不差”三字，必已经误汗，故方中不用麻黄，而用芍药、桂枝、甘草、大枣，然芍药、桂枝、甘草、大枣，亦在随机酌用。前条治法可类推。

太阳病不解，热结胸中，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃仁承气汤。

此条与太阳病不解，热结胸中，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃仁承气汤。此条与太阳病不解，热结胸中，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃仁承气汤。此条与太阳病不解，热结胸中，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃仁承气汤。

桃仁承气汤

桃仁五十个，去皮尖 桂枝 二两 甘草二两 大黄四两，酒浸 芒硝 二两

先煮四味，去渣，内硝，微沸，先食温服五合，日三服，当微利。

先食者，谓先服药而后进食也。

太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在里，少腹当硬满，小便不利者，下血乃愈。所以然者，以热在里，故也。当以桃仁承气汤下之。

此条与太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在里，少腹当硬满，小便不利者，下血乃愈。所以然者，以热在里，故也。当以桃仁承气汤下之。此条与太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在里，少腹当硬满，小便不利者，下血乃愈。所以然者，以热在里，故也。当以桃仁承气汤下之。

1 二两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“二两”。

2 一两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“二两”。

，当主下，反以抵当汤下之，作人禁。桃仁之甘苦，以下为热，下之反利，不足以为下者久，犹得生于下，必用抵当汤是也。学者细思之。

抵当汤

水蛭三十个，猪油熬黑 虻虫三十个，去翅足，猪脂熬，即牛马身上虻 桃仁三十粒 大黄二两，酒洗

俱为末，水四升，煮三升，去渣，服一升，不下，再服。

太阳病身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血结膀胱也，抵当汤主之。

身黄，脉沉结，少腹硬，以小便利、不利为辨者，何也？身黄为瘀血，血结膀胱为大结，瘀血为热结，身黄主小便不利，身黄瘀血为身黄，必身黄而小便不利，此谓瘀血结于膀胱，小便自利，身黄化而身白，即身黄而小便利，身黄有一之证也，认得清楚，何疑何悖而不遵古方？

伤寒有热，少腹满，小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。

上二证，皆瘀血也，故与抵当汤下之，抵当汤方不是以抵当此病，故不用汤而用丸，分两亦稍减。

抵当丸

水蛭二十个 虻虫二十五²个，制俱如前 大黄二两 桃仁二十³个，制俱同

共杵为末，分作四丸，先服一丸，不下，再服。

发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而恶风，无大热者，可与麻

1 三十粒；《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“二十个”。

2 二十五个；《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“二十个”。

3 二十个；《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“二十五个”。

黄杏仁甘草石膏汤主之。

不可更行，欲吐者，不可下，宜从少阴治之。身热中无热，木反，心下大热，口干燥者，不可下。欲吐下利，不可下，下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。

麻黄杏仁甘草石膏汤

麻黄四两，去节 杏仁五十粒，去皮尖 甘草二两，炙 石膏半斤，碎

水七升，先煮麻黄，减二升，去沫，内诸药，煮二升，温服一升。

下后不可更行桂枝汤，若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

伤寒下后，心下痞，按之濡者，为虚痞，不可下。下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。

伤寒下后，心下痞，按之濡者，为虚痞，不可下。

伤寒下后，心下痞，按之濡者，为虚痞，不可下。下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。

栀子厚朴汤

栀子十四枚，擘 厚朴四两，姜炙 枳实四枚，水浸，去瓤，炒 水三升半，煮一升半，去滓，分二服，温进一服，得吐者止。

伤寒，身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。身大热，反欲得近衣者，不可下，下之，则利不止。

是心火下移于肺，上通于已之天，与木火同中也；心火下移于肾，下通于已之地，与水土同中也。故以干姜之辛以通心火，以石膏之辛以通心火，以益气，辛以润之也。

梔子干姜汤

梔子十四枚，劈 干姜二两

水三升半，煎升半，去滓，分二服，先进一服，得吐者止。

伤寒六日，大下之后，身热不去，心下结痛者，未欲解也。梔子豉汤主之。

此汤，以梔子之苦，使邪气下，以干姜之辛，使邪气上，加香豉则散在表之邪，使未解者解也。

按：梔子泻心肺之邪热，使屈曲下行。经文从无“使吐”字样，历来皆误。

梔子豉汤

梔子十四枚，劈 香豉四合，绵裹

水四升，先煮梔子，得二升半，内豉，煮一升半，去滓，分二服

发汗若下之，乃心下结痛者，梔子豉汤主之

卒与结痛略同，胸与心部位同，故主治亦同。

发汗吐下后，当身不得眠，若躁者，必反反复复，心中懊悵，梔子豉汤主之。

虽有剧者诸症，总是虚烦也。不经汗下，邪气蕴蓄于膈，则心下结痛；经汗下，邪气散于胸中，则心中懊悵。故《伤寒论》云：「发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反反复复，心中懊悵，梔子豉汤主之。」

1. 心下：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“心中”。

从来多沿误。

若少气者，梔子甘草豉汤主之。

少气为气伤，甘草所以和之也。

梔子甘草豉汤

梔子十四枚 香豉四合 甘草二两

煮法同，分二服，得吐止后服。

若呕者，梔子生姜豉汤主之。

呕必素有痰饮，挟寒邪而上逆，生姜所以散之也。

梔子生姜豉汤

梔子十四枚 香豉四合 生姜五两

煎法同前，分二服。

凡用梔子汤，病人旧微溏者，不可与服之。

旧微溏，则阳虚而寒在下，不宜用上越之法。《内经》云：先泄而后生他病者，治其本，必先调之，后治其他病。

伤寒脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。

脉动而中止，能自还者曰结，不能自还曰代，血气虚衰，不能相续也。心动悸，真气内虚也，人参、麦冬、甘草、大枣

、桂枝、生姜、清酒，以散余邪，加清酒，助药力也。

炙甘草汤《千金要》用治虚劳，《外台》用治肺痿。

甘草四两，炙 生姜切 桂枝各三两 去皮 人参 阿胶各二两 生地黄一斤 麦门冬去心 麻子仁各半升 大枣十二枚¹

清酒七升，水八升，先煎八味，取三升，去滓，内胶熔化，温服一升，日三服。

1 十二枚：《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“三十枚”。

伤寒发汗后，身目发黄，所以外者，湿在里，不得故也，以为不可下也，于寒湿中求之。

发汗已而发黄，此必风气去，湿气在也。瘀血之黄可下，身重下重，不可下，身重下重，不可下，身重下重，不可下。此条总领下三条之意。

伤寒发汗后，身目发黄，麻黄连翘赤小豆汤主之。身重下重，不可下，身重下重，不可下，身重下重，不可下。此条总领下三条之意。

麻黄连翘赤小豆汤

麻黄去节 连翘连翘根也 生姜 甘草炙，各二两 杏仁四十粒，去皮尖 生梓白皮 一升 赤小豆 一升 大枣十二枚，劈

以潦水一斗，煮麻黄，去沫，内诸药，煮三升，分三服，半日服尽。

伤寒身黄发热者，栀子柏皮汤主之。

身黄者，身重下重，不可下，身重下重，不可下，身重下重，不可下。此条总领下三条之意。

栀子柏皮汤

栀子十五枚 柏皮 一两¹ 甘草 一两
水三升，煮升半，分二服

伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。

身黄者，身重下重，不可下，身重下重，不可下，身重下重，不可下。此条总领下三条之意。

1 一两：《伤寒论》作“二两”。

利，乃更下之，至夜半止，下重，大便不利，其热不减，日夜利，
 栀子为臣，大黄为佐，前后分泄之。

茵陈蒿汤

茵陈蒿六两 栀子十四枚 大黄二两

水一斗，先煮茵陈，减六升，内二味，煮三升，分三服。

下之后，复发汗，必振寒，脉微细，所以然者，以内外俱
 虚故也。

振寒为外虚，脉细为内虚。

下之后，复发汗，针日晡躁不得眠，夜有安静，不呕，不
 渴，无表证，脉微细者，当灸附子汤主之。

此证下之后，夜有安静，无大热，是阳下陷，知此
 而不投以辛甘大热，亟亟挽回者，何以医为？

干姜附子汤

干姜一两 附子一枚，去皮，切八片

水三升，煮一升，去渣，顿服。

伤寒，阳脉浮，反欲得近火者，当灸也，乃为甘草附子汤主之。
 此证大虚寒，四肢麻木，身重骨痛，故以甘草附子汤
 主之，此方一治，若补虚药，则愈速矣，但日晡时，
 引阳入阴，故用附子以助之，乃为以阳助阳，乃为补虚之良
 法。一阴一阳，恐不和谐，加甘草以和之。仲景真圣于医者，
 奈何有眼不识乎？

芍药甘草附子汤

芍药 甘草炙，各二两 附子一枚，炮，去皮

1 脉微细：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“脉沉微”。

2 栝：原作“栝”，据《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》改。

服汗者，即停后服。

此方与桂枝汤、芍药甘草汤、桂枝加芍药汤、桂枝加附子汤、桂枝汤有主，芍药甘草汤、桂枝加芍药汤、桂枝加附子汤，似与麻黄证矣，所异者烦躁耳。

按：烦躁，有阳虚者，汗下后之烦躁也。有阴虚者，少阴病，吐利厥逆之烦躁也。此之营卫两伤，则烦为风，躁为寒，皆由汗不出，阳气不发越之故，故合用麻黄、桂枝。去芍药者，无汗不用固营。加石膏者，体重气轻，藉以宣达郁热也。此条自成注以下俱冗而不切，致有此汤峻险之疑，细加研晰，庶几漆室之一灯矣。此证在认清烦躁，尤在认清不汗出。若汗出恶风而不烦躁，桂枝证也，脉微弱，少阴证也，误服此汤，有不亡阳而筋惕肉瞤者乎？真武以救，救其阳也。

伤寒见风

伤寒见风，身重如石，身有轻时，无少阴之欲寐者，大青龙发之。

成无己曰：寒必身疼，此以风胜，故不疼。中寒必身重，身重者，阳气内陷，故身有重感。无少阴之欲寐者，阳气未陷，乃风邪外甚也，故曰发之。《尚论》曰：但身重，而无少阴之欲寐，是身重而身有轻时，乃风邪外甚，又非少阴可知。

伤寒表不解，心下有水气，干呕，或喘，或利，或渴，或小便不利，少腹满，或身重者，小青龙汤主之。

解，里证兼表证也。

1 漆室：暗室。

2 脉浮：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“脉浮缓”。

小青龙汤¹

麻黄去节 桂枝酒洗 甘草炙 细辛各二两² 干姜二两³
熟⁴半夏 五味子各半升

水一斗，先煮麻黄，去沫，减二升，煮取三升，温服一升。

本方治寒饮之人，感于风邪，水饮内停，肺气壅遏，故见咳嗽，痰多，喘急，胸满，头眩，身重，恶寒，无汗，脉浮。此方以麻黄、桂枝发汗，细辛、干姜温肺化饮，半夏、五味子降逆化痰，甘草调和诸药。水一斗，先煮麻黄，去沫，减二升，煮取三升，温服一升。此方为治寒饮咳嗽之圣方。凡患咳嗽，痰多，喘急，胸满，头眩，身重，恶寒，无汗，脉浮者，服之立效。此方为治寒饮咳嗽之圣方。凡患咳嗽，痰多，喘急，胸满，头眩，身重，恶寒，无汗，脉浮者，服之立效。

小青龙加减法

若微利者，去麻黄，加芍药、黄芩、人参，故令青色。

下利忌攻表，恐汗出而胀满也，易芍药，导水也。

若喘者，去麻黄，加附子一枚，炮。

此方为治寒饮咳嗽之圣方。凡患咳嗽，痰多，喘急，胸满，头眩，身重，恶寒，无汗，脉浮者，服之立效。此方为治寒饮咳嗽之圣方。凡患咳嗽，痰多，喘急，胸满，头眩，身重，恶寒，无汗，脉浮者，服之立效。

若小便不利，少腹满，去麻黄，加茯苓四两。

通窍而利水道。

若渴者，去半夏，加瓜蒌根三两。

半夏耗津液，瓜蒌撤热而生津。

若喘者，去麻黄，加杏仁半升，去皮尖。

麻黄发阳气，杏仁润肺而降。

伤寒心下有水气，咳而微喘，发热不渴，服汤已渴者，此

1 小青龙汤：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》本方有“芍药二两”。

2 二两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“二两”。

3 二两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“三两”。

4 熟：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》无此字。

脉反自恶寒者，此邪正相争，不可更发汗，更下，更吐也。面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此邪正相争，不可更发汗，更下，更吐也。面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。此方为轻剂，以见发散兼和解之意。

桂枝麻黄各半汤¹

桂枝 一两六铢² 芍药 洗 甘草炙 生姜 麻黄去节，各一两
水五升，先煮麻黄，去沫，内诸药，煮一升八合，去渣，温服六合。

太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此邪正相争，不可更发汗，更下，更吐也。面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

桂枝二越婢一汤

桂枝去皮 芍药 甘草 麻黄去节，各七钱五分³ 生姜 一两⁴
大枣四枚 石膏 一两⁵

水五升，先煮麻黄，去沫，内诸药，煮二升，温服一升。

1 桂枝麻黄各半汤：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》本方有“大枣四枚，杏仁二十四枚”。

2 一两六铢：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》作“一两十六铢”。

3 各七钱五分：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》作“各十八铢”。

4 一两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》作“一两二铢”。

5 一两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》作“二十四铢”。

，过此少，则汗出不止，反成亡阳，此当急下。若汗出不止，反成亡阳，此当急下。若汗出不止，反成亡阳，此当急下。若有汗，麻黄可更减少。

服桂枝汤，大汗出，恶寒者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

伤寒发汗，汗出不止，恶寒者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。若汗出不止，恶寒者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

桂枝二麻黄一汤

桂枝一两十六铢^① 芍药酒洗，一两八铢 生姜一两六铢 甘草一两二铢 麻黄十六铢 杏仁十六粒 大枣五枚

水五升，先煮麻黄，去沫，内诸药，煮二升，日再服。

服桂枝汤，大汗出，恶寒者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

服桂枝汤，大汗出，恶寒者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。若汗出不止，恶寒者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

桂枝去桂加茯苓白术汤

芍药酒洗 生姜切 茯苓 白术各二两 甘草炙，一两^② 大枣十二枚

微火煮三升，服一升，小便利则愈。

① 一两十六铢：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》作“一两十七铢”

② 一两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》作“二两”。

发汗，若下之，心仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。
 此证因下后亡阳，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉微者，为亡阳证，身重者，为阳虚，故用茯苓四逆汤。茯苓四逆汤，茯苓六两，人参一两，干姜一两半，附子一枚，破，甘草一两¹，炙。
 水五升，煮三升，分三服。

茯苓四逆汤

茯苓六两¹ 人参一两 干姜一两半 附子一枚，破 甘草一两²，炙

水五升，煮三升，分三服。

伤寒下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉微者，为亡阳证，身重者，为阳虚，故用茯苓四逆汤主之。

吐下后，必里虚，故心下逆满，气上冲胸也。表虚阳不足，故身重。此证因下后亡阳，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉微者，为亡阳证，身重者，为阳虚，故用茯苓四逆汤。茯苓四逆汤，茯苓六两，人参一两，干姜一两半，附子一枚，破，甘草一两¹，炙。
 水五升，煮三升，分三服。

茯苓桂枝白术甘草汤

茯苓四两 桂枝三两 白术 甘草炙，各二两

伤寒吐下后，发汗，虚烦，欲起微，八九日心下痞硬，胁下痛，气上冲逆，眩暈，经脉动惕者，久用茯苓

此证因下后亡阳，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉微者，为亡阳证，身重者，为阳虚，故用茯苓四逆汤。

1 六两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“四两”。

2 一两：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“二两”。

微恶寒，反身重，头重，心下悸，口开，身大冷，是阳亡也。身大冷，是阳亡也，口开，是阳亡也，反身重，是阳亡也，头重，是阳亡也，心下悸，是阳亡也。此证者，阳亡也，不可治，不治者，死。此证者，阳亡也，不可治，不治者，死。此证者，阳亡也，不可治，不治者，死。

伤寒八九日，风湿相搏，身体烦疼，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。

伤寒八九日，不传经，不入里，风与湿持之也。烦疼为风，不呕不渴，脉浮虚而涩者，风之持也。风湿相搏，身体烦疼，不能自转侧，是风与湿持之也。此证者，风与湿持之也，不可治，不治者，死。此证者，风与湿持之也，不可治，不治者，死。此证者，风与湿持之也，不可治，不治者，死。

桂枝附子汤

桂枝四两 附子三枚，炮，去皮，切 甘草炙，二两 生姜三两 大枣十二枚

水六升，煮二升，去滓，分服，日三服。

若其人反快，小便不利者，去桂枝加白术汤主之。

经云：伤于湿者，必小便不利，大便反快。今大便硬，则邪已入里，不可治，不治者，死。此证者，邪已入里，不可治，不治者，死。此证者，邪已入里，不可治，不治者，死。此证者，邪已入里，不可治，不治者，死。此证者，邪已入里，不可治，不治者，死。

白术附子汤

白术四两 附子三枚，去皮，切 甘草炙，二两 生姜三两 大枣十二枚

水六升，煮二升，去滓，分服，日三服。

风湿相搏，骨节烦疼，手足不仁，近之则痛剧，言出微气，小便不利，亡阳不读五表，或身大冷者，甘草附子汤主之。

伤寒脉浮，发热，无汗，其表不解者，不可与白虎汤，渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。

1 此条与第22条，均谓“无表证”，盖表证已极，故谓之无表证，加参者，润以生卫津也。

伤寒无大热，口燥渴，心烦躁，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

此条与第22条，均谓“无表证”，盖表证已极，故谓之无表证，加参者，润以生卫津也。与胃虚恶心、大便不实者，不可误用。

伤寒脉浮，若下之，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。

此条与第22条，均谓“无表证”，盖表证已极，故谓之无表证，加参者，润以生卫津也。与胃虚恶心、大便不实者，不可误用。

伤寒脉浮，若下之，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。

此条与第22条，均谓“无表证”，盖表证已极，故谓之无表证，加参者，润以生卫津也。与胃虚恶心、大便不实者，不可误用。

附：宋元后诸贤表证方论¹

伤寒，脉浮，发热，恶寒，身重，无汗，其表不解者，不可与白虎汤，渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。

1 附宋元后诸贤表证方论：原书目录中缺

有汗者，不可发汗，无汗者，不可不发汗。此仲景之法也。今集诸法于仲景之后，令人不犯虚虚之戒。

朱丹溪曰：有卒中天地之寒气者，有口食生冷之物者。邪气内侵，正气内虚，加发散药。气虚者，少用附子以行参、术之气。方载虚损卷中。

按：东垣以饮食劳倦为内伤。如饥则仓虚，必伤胃气，饱则胃满不化，必伤脾气，劳力伤筋骨，劳心伤精血，无论富贵贫贱，皆足以致困倦。有一无能，因倦极而忽然发热畏寒，少食懒言嗜卧者，此病不可作外感治者也。即有体虚易于感冒，至发热头痛，脉浮等，其类伤寒。然误用汗、吐、下三法，已害阳虚，主见其始。此东垣辨断外伤、内伤，唤醒万事如梦，而立补中益气汤以垂训者也。

黄芪汤

白术炒 黄芪 防风各等分

每服五六钱至一两，水煎，温服。汗多甚者，加桂枝。洁古云：有汗则能止之。

川芎汤

川芎 制苍术 羌活

每服五七钱至一两，水煎，热服。无汗恶风甚者，加麻黄。洁古云：无汗则能发之。

神术汤

苍术制炒 防风各二钱 甘草一钱

此汤乃东垣治内伤之圣药也。凡饮食劳倦，感冒风寒，身重恶寒，无汗，脉浮者，服之立效。此汤能补脾胃，益元气，祛风湿，除寒湿。凡内伤外感，皆可服用。此汤乃东垣治内伤之圣药也。

扶正之药，即是月事候要者，支者热也，钱者寒也，但六脉无
力，寸口沉，此乃大虚也。不可用补，不可用攻，名曰一药一吸
补托散，即补中益气，乃钱氏方也，此方自以托散，即此方也。
服此药者，忌食生冷等物，忌用汗法，不可服下。又曰：
此药补而不实，不可用汗，不可用下，必用托散，必用托散，凡此
必无救也。此方即补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，俱
属名言。

熟地三五七钱 制白术二五钱 当归三五钱，泄者用山药代 人
参二钱，甚者一两或不可亦用 炙草一钱 柴胡二三钱 麻黄一二钱
肉桂一二钱 干姜炒熟，一二钱，或煨生姜五七片

本方，补中益气，即补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，
子，大加加用，或补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，
细辛。

按：此方与补中益气接武^①，持论互相发明，真救世宝筏也。予
亲见有炽热汗透，怕寒更甚，屡导以温补发散之法。而从而心违，盖
习俗沿误，沉痾不返矣。

东垣麻黄人参芍药汤

麻黄 白芍 黄芪 炙草各一钱 五味五粒 桂枝五分 麦
冬 人参各三分 当归五分

此方内有八味，即补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，
者，即补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，
方之有补者多矣。予自补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，
内外方。凡补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤，即补中益气汤。

① 接武：前后相接。

卷 三

阳明证总论¹

阳明有经病、有腑病。经病者，为身热目疼，鼻干不眠，口燥咽干，渴引水浆，身重不可转侧，自汗出，脉洪大，或身大热，反欲得近衣者，不可下之。腑病者，为胃中燥，口燥咽干，渴引水浆，身重不可转侧，自汗出，脉洪大，或身大热，反欲得近衣者，不可下之。阳明经病，身热目疼，鼻干不眠，口燥咽干，渴引水浆，身重不可转侧，自汗出，脉洪大，或身大热，反欲得近衣者，不可下之。阳明腑病，胃中燥，口燥咽干，渴引水浆，身重不可转侧，自汗出，脉洪大，或身大热，反欲得近衣者，不可下之。阳明经病，身热目疼，鼻干不眠，口燥咽干，渴引水浆，身重不可转侧，自汗出，脉洪大，或身大热，反欲得近衣者，不可下之。阳明腑病，胃中燥，口燥咽干，渴引水浆，身重不可转侧，自汗出，脉洪大，或身大热，反欲得近衣者，不可下之。

阳明上篇

伤寒三日，阳明脉大。

伤寒三日，阳明脉大。阳明者，多气多血，故脉大，谓比太阳脉差大也。

本太阳初起时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。推言所以转属阳明之故。此条不及。

阳明者，因发其汗，出多者，亦为太过。太过为阳绝于里，亡津液，大便因硬也。

1 阳明证总论：原书目录中缺。

此即伤寒之证也。答曰：发大汗之后，身当凉，反身大热者，此证也。发汗之后，身反大热，以与伤寒证同，故曰：伤寒证也。此条太过，皆医误之故。

身微重者，为中风也。身重多者，为大过

微，即中风脉之缓也。

问曰：阳明病外证如何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。

此即阳明病之证也。答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热，此即阳明病之证也。与中风之汗不同。

问曰：病有一日得之，不发其恶寒者，何也？答曰：病得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。

此亦阳明外证，尚兼太阳。

问曰：恶寒何故自罢？答曰：阳明居中土也，万物无归，无所复传，始虽恶寒，一旦自罢，此为阳明病也。

此乃阳明之证，与太阳病不同。答曰：阳明病者，胃中不和，身大热，反恶寒者，此乃阳明病也。阳明病者，胃中不和，身大热，反恶寒者，此乃阳明病也。阳明病者，胃中不和，身大热，反恶寒者，此乃阳明病也。

阳明病，能食者为中风，不能食者为中寒。

此乃阳明病之证也。答曰：阳明病者，胃中不和，身大热，反恶寒者，此乃阳明病也。阳明病者，胃中不和，身大热，反恶寒者，此乃阳明病也。阳明病者，胃中不和，身大热，反恶寒者，此乃阳明病也。盖溯其来源而分之也。

阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。

迟即缓之甚者，桂枝证尚在，使风邪仍从卫解。

阳明病，脉浮、无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。

浮即紧之轻者，麻黄证尚在，使寒邪仍从营出。

问曰：何缘得从营出？答曰：太阳病，若下、若发汗，若利小便，亡其津液，胃中干燥，因转属阳明。不更衣，内实，大便难者，此名阳明也。

此太阳病，下之，津液亡，转属阳明者。外证未除，虽自汗出，而不大便，是太阳之证，因下而又转属，故列此也。

阳明病，但头眩，不恶寒，欲得食而咳，其人必咽痛。若不咳，咽不痛。

头眩者，风邪上攻，不恶寒者，非太阳也。他人本恶寒，反不恶寒，故云。欲得食，非太阳之本证也。仲景恐人误认，故申言之。

阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。

阳明病，以多汗者，当亡其津，法当身重。反无汗，反身如虫行，此以不汗、表之状。久虚，必不能食而胃不实，非谓当用补也。

阳明病，反无汗，而小便利，一身尽热而咳，手足厥者，必苦头痛。若不呕不咳，手足不厥者，头不痛。

问曰：阳明病不大便，无汗而咳，手足厥者，当攻之乎？曰：邪热在里，不大便，无汗而咳，手足厥者，邪热在里，不在下而在上，攻之反助其邪。若不呕不咳，手足不厥，而小便利者，邪热从水而出，岂有逆攻颠顶之理哉。

阳明病，口燥，但欲漱水，不欲咽者，此必衄。

阳明病，口燥而欲漱水，不欲咽者，阳明气热多，血热妄行也。衄者，鼻出血也。邪热在里，故妄行也。邪入

小柴胡汤载少阳上篇

《伤寒论》云：「少阳之为病，口苦咽干，目眩也。」此少阳病之提纲也。少阳者，胆经也。胆经之脉，起于目眦，上至头角，下至足趾。少阳之病，胆气不和，则口苦咽干，目眩也。少阳之病，不可发汗，不可下，不可利。少阳之病，治法以和解为主。小柴胡汤，少阳之主方也。其方用柴胡、黄芩、人参、半夏、生姜、大枣、甘草。此方之功用，能和解少阳，调达肝气，清肝胆之热，和胃气之逆。凡患少阳病者，服此方必效。

食谷欲呕者，属阳明也，吴茱萸汤主之。得汤反呕者，属上焦也。

此条言阳明病之证候。阳明者，胃经也。胃经之脉，起于鼻，上至目眦，下至足趾。阳明之病，胃气不和，则食谷欲呕。吴茱萸汤，阳明之主方也。其方用吴茱萸、人参、生姜、大枣。此方之功用，能温中下气，降逆止呕。凡患阳明病者，服此方必效。

吴茱萸汤

吴茱萸一升，洗 人参三两 生姜六两 大枣十二枚

水七升，煮二升，去渣，温服七合，日三服。

此方之功用，能温中下气，降逆止呕。凡患阳明病者，服此方必效。此方之组成，吴茱萸、人参、生姜、大枣。吴茱萸性温，能温中下气，降逆止呕。人参性平，能补虚益气。生姜性温，能温中下气，降逆止呕。大枣性平，能补虚益气。此方之功用，能温中下气，降逆止呕。凡患阳明病者，服此方必效。

阳明病，应发汗，医下之，此为大逆。

此条言阳明病之治法。阳明者，胃经也。胃经之脉，起于鼻，上至目眦，下至足趾。阳明之病，胃气不和，则食谷欲呕。阳明之病，不可发汗，不可下，不可利。阳明之病，治法以和解为主。小柴胡汤，少阳之主方也。其方用柴胡、黄芩、人参、半夏、生姜、大枣、甘草。此方之功用，能和解少阳，调达肝气，清肝胆之热，和胃气之逆。凡患少阳病者，服此方必效。

阳明病，心下硬者，不可攻之。攻之利遂不止者死，利止者愈。

1 医雠：指医术不精的医生。

微邪在下，微邪聚于胃，犹在下焦也。攻之不利，邪入胃中，利在下者死，利，有正邪也。利下，正邪仍在，邪邪可解而愈。

伤寒呕多，虽是阳明症，不可攻之。

呕多者，邪多聚于胃也，虽有阳明诸证，而下之犹使上邪下陷乎？况少阳亦有呕者，妄下尤所当戒。

阳明中风，口苦咽干，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧，若下之，则腹满小便难也。

口苦咽干微喘，从人邪也，口苦咽干，从风邪也，脉浮而紧，从寒邪也，从人邪者，邪聚于胃，从风邪者，邪聚于肺，从寒邪者，邪聚于脾，三者皆不可下。

夫病阳多者热，下之则硬。

阳明病，以脉迟为不可下，若脉迟而大便硬者，不可下。

无阳阴强，大便硬者，下之必清谷腹满。

无阳，谓人邪也，阴强，谓人邪也，人邪聚于胃中，下之则清谷腹满，不可下也。

阳明病，脉迟，食难消化，饱闷腹满，大便难，必小便难，此欲作谷疸也。下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

阳明病，脉迟，食难消化，饱闷腹满，大便难，必小便难，此欲作谷疸也。下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。阳明病，脉迟，食难消化，饱闷腹满，大便难，必小便难，此欲作谷疸也。下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

以上六条，皆不可下之证。

阳明病，若中寒，不能食，小便不利，手足微然汗出，此欲作固瘕也，必大便初硬后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不

1 固瘕：病名，脾胃虚寒所致大便先硬后溏的病证。

者不可攻也。身发黄色者，不可攻也。何以知之？以小便不利也。身发黄色者，从太阳传入也，在太阴经及脾者，身发黄色，如何夜半临深池？

阳明病，发热汗出，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴欲饮水者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿主之。

伤寒从太阳，得不尿，从少阴，得不尿者，身必发黄也。又伤寒，身发黄色，是热过里也。身发黄者，热由小便出，大黄使大便出也。

阳明病，面合赤色，不可攻之。攻之必发热，色黄，小便不利也。

合，言面赤，言赤在身之表，大与里。之合，言外邪入里者，言其人面有赤色，不可攻之，攻之必发热，色黄，小便不利也。

阳明病，无汗，小便不利，心中懊者，身必发黄。又阳明病，身无汗，小便不利，身必发黄，不从下泄，而蒸于内，所以发黄。

阳明病，被火，额上汗出，小便不利者，必发黄。此热邪得火而愈炽也。

阳明病，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘，屎虽硬，大便反易，其色必黑，宜抵当汤下之。

喜忘者，久瘀血也。所以喜忘者，乃其人本有久瘀血，故令喜忘，屎虽硬，大便反易，其色必黑，宜抵当汤下之。又阳明病，身无汗，小便不利，身必发黄，对酒大黄，亦神效。

阳明病，下血谵语者，此为热入血室，但头汗出者，刺期

门，随其实而泄之，濇然汗出则愈。

下为泄，泄者，下利也。下利者，心下痞，按之硬，其人反，心下满，按之硬，此以邪气结于心下，胃中不和，下利，此其证也。泄之者，思所以解之也。

病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热而结，宜攻之，至六七日不大便者，有燥屎也，自抵当汤。若脉数不解，而下利不止，必协热而便脓血也。

此言下利，下利者，下利也。下利者，心下痞，按之硬，其人反，心下满，按之硬，此以邪气结于心下，胃中不和，下利，此其证也。泄之者，思所以解之也。

太阳病，下利，寸脉关尺俱浮，其人发热，下利，复恶寒，不渴，但心下痞者，此以误下之故。若脉下利者，病人不渴，反恶寒，此转属阳明也。小便利者，大便必硬，不更衣，十日，无汗也。当以承气汤，和利与之，但以去积之。若者，下利者故。

太阳病全具，而忽焉心下痞者，定是误下之故。若不误下，亦下利，下利者，下利也。下利者，心下痞，按之硬，其人反，心下满，按之硬，此以邪气结于心下，胃中不和，下利，此其证也。泄之者，思所以解之也。

1 脉数不解：原作“若脉不解”，据《伤寒论·辨少阳病脉证并治》

2 下利：《伤寒论·辨少阳病脉证并治》作“下”。

3 枢机：看情况。

4 更衣：即如厕。

5 不恶寒而渴：原作“但恶寒而渴”，据文义改。

阳明下之，其外有热，手足温，不汗出，心中懊恼，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。

言上之证，凡受暑湿，其手足温，然其气未全伤也，故但心中懊恼不食，但汗不出也，非气虚有汗也。夫阳明者，其气上蒸，用栀子豉汤，在上者因而越之也。

伤寒多阳证，视其阳证，知有部不利，利之则愈。夫阳明不利，其气上蒸，故用栀子豉汤，利其阳，如五苓，利其后如大柴胡，方合内外两解，非承气也。

夫实则谵语，虚则郑声。郑声，重语也。

重语者，字句重叠，真气消亡之象。

直视谵语，喘满者死，下利者亦死。

直视者，目睛直视，大其瞳人，此乃阳明证，阳明证者，有自汗有力者，此乃阳明证，有大汗亡阳者，此乃阳明证，有下利者，此乃阳明证，此乃阳明证，此乃阳明证，故皆曰死也。

阳明证者，不可下，下之则身重，身重者，水气不下，则身重，身急痛，下利日数行。

阳明证者，不可下，下之则身重，身重者，水气不下，则身重，身急痛，下利日数行。

者外实者，不可下，下之则发微热，亡脉，微者，当轻汗热。

者外实者，不可下，下之则发微热，亡脉，微者，当轻汗热。

者虚者，不可下，下之则大渴，求水者易愈，恶水者死。

脉数者，不可下，下之必烦利不止。

脉数者，不可下，下之必烦利不止。

阳明中篇

问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约是也。正阳阳明者，胃家实是也。少阳阳明者，发汗利小便已，胃中烦，躁、实，大便难是也。

太阳病，十日以上不解者，转属阳明也。伤寒，发热，汗多，不解，转属阳明也。伤寒，汗多，不解，转属阳明也。

阳明之为病，胃家实也。

此曰“阳明”，病在阳明也。阳明者，胃家也。胃家实者，胃中实也。胃中实者，大便难也。大便难者，转属阳明也。

伤寒转系阳明者，其人濇濇然微汗出也。

阳明病，汗多，不更衣，口干燥，渴欲饮水，不可与冷水也。

阳明病，本自汗出，反更重发汗，病已差，而微烦不了了者，此大便必硬故也。所以然者，胃中干燥，故令大便硬。当问小便日几行，若本小便日三四行，今反三四行，故知大便不久

1 脾约：病名。为脾虚津耗，肠液枯涸所致大便艰涩的病证。

1. 今为小便利数少，以津液当还入胃中，故知不久当大便也。

方为“承气”者，言其下之也。仲景不治之治。

病人身大热，反欲得近衣者，又见脉微，且自汗出者，属阳明也。身大热者，宜下之。身大热者，宜发汗。下之与发汗，发汗宜桂枝汤。

身大热者，反欲得近衣者，又见脉微，且自汗出者，属阳明也。身大热者，宜下之。身大热者，宜发汗。下之与发汗，发汗宜桂枝汤。

身大热者，反欲得近衣者，又见脉微，且自汗出者，属阳明也。

身大热者，反欲得近衣者，又见脉微，且自汗出者，属阳明也。身大热者，宜下之。身大热者，宜发汗。下之与发汗，发汗宜桂枝汤。

身大热者，反欲得近衣者，又见脉微，且自汗出者，属阳明也。身大热者，宜下之。身大热者，宜发汗。下之与发汗，发汗宜桂枝汤。

蒸蒸，热气腾貌，如蒸炊然，其热在胃，故调胃以和之。

调胃承气汤

大黄四两，酒浸。甘草二两，炙。芒硝半升。

水三升，煮取一升，内硝微沸，少少温服之。

黄、硝二物，下行甚速，故用甘草以缓之。又《本草》云：大黄，性寒，能下，芒硝，性寒，能下，甘草，性平，能缓。此汤，为阳明病，下之不用酒制，专为攻下者，各有微义。

阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。

1. 脉虚者：《伤寒论·辨阳明病脉证并治》作“脉浮虚”。

利，下利，不可与调胃承气汤，以调胃承气汤，利之证，故与调之。

伤寒吐后，腹胀满者，可与调胃承气汤。

伤寒吐后，腹胀满者，不可与调胃承气汤，以调胃承气汤，利之证，故与调之。

阳明病，脉浮而迟，身重，小便数，浮涩相搏，大便则难，其脾为约，麻仁丸主之。

麻仁丸，调胃承气汤，以调胃承气汤，利之证，故与调之。

麻仁丸

麻子仁二升，熬，晒，去壳 芍药 枳实各半斤 大黄 厚朴 制¹⁾ 杏仁²去皮尖，各一斤

蜜丸桐子大，每服十丸，日三服。

阳明病，脉浮而迟，身重，小便数，浮涩相搏，大便则难，其脾为约，麻仁丸主之。

麻仁丸，调胃承气汤，以调胃承气汤，利之证，故与调之。

1 厚朴：《伤寒论·辨阳明病脉证并治》作“厚朴一尺”
2 杏仁：《伤寒论·辨阳明病脉证并治》作“杏仁一升”
3 承气汤：《伤寒论·辨阳明病脉证并治》作“大承气汤”。

阳明病，下之，其人反大下者，未可复下也。下之，心下硬者，复下之，心下硬者，不可攻也。阳明病，下之，心下硬者，不可攻也。阳明病，下之，心下硬者，不可攻也。阳明病，下之，心下硬者，不可攻也。

阳明病，下之，心中懊侬有烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溲，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

阳明病，下之，心中懊侬有烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溲，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

阳明病，下之，心中懊侬有烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溲，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

阳明病，下之，心中懊侬有烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溲，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

阳明病，下之，心中懊侬有烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溲，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

阳明病，下之，心中懊侬有烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溲，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

发汗不解，腹满痛，急下之，宜大承气汤。

发汗不解，必发不中也。腹痛而下之，必止痛。

腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。

减不足言，谓满至十分，即少减不足缓之，则下亦不宜缓也。

伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，

...以熟地为主，禁用寒凉药。

伤寒一日，邪气方尽，二日当受邪。其人反能食不呕，此为三阴不受邪也。

能食不呕，即胃和则愈之义。

伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。

少阳脉当弦紧，小则邪微欲解之兆。

伤寒四日，身热恶寒，太阳表也，头项强，兼阳明也，胁满，手足温，少阳半表也，此三阳合病，欲罢不能，自当汗出而愈。汗出而愈者，汗出则邪随汗而解也。此三阳合病，欲罢不能，自当汗出而愈。汗出而愈者，汗出则邪随汗而解也。

身热恶寒，太阳表也，头项强，兼阳明也，胁满，手足温，少阳半表也，此三阳合病，欲罢不能，自当汗出而愈。汗出而愈者，汗出则邪随汗而解也。此三阳合病，欲罢不能，自当汗出而愈。汗出而愈者，汗出则邪随汗而解也。

小柴胡汤

柴胡半斤 半夏半升，酒洗 人参 甘草 黄芩 生姜各二两 大枣十二枚

邪入少阳，由表面将至里也，当彻热发表，迎而夺之，勿令入里。人参、甘草、大枣，补胃气而和中，使邪不传里为佐。表属卫，里属营，姜、枣辛甘，以和营卫为使也。

加减法

伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。若胸中烦而不呕，去半夏、人参，加瓜蒌实一枚。

烦而不呕，热聚而气不逆也。热聚者，气必闷，故无用人参之理。胸中烦而不呕，去半夏、人参，加瓜蒌实一枚。胸中烦而不呕，热聚而气不逆也。热聚者，气必闷，故无用人参之理。

若渴者，去半夏，加人参，合芪四两半，大枣四两。

又方，人参、甘草、大枣、芍药、桂枝、茯苓、白术、炙甘草。

津，二者宜加。

若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两。

又方，人参、甘草、大枣、芍药、桂枝、茯苓、白术、炙甘草。

若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两。

甘能满中，故去枣。咸能软坚，故加牡蛎。

若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两。

水停心下则悸，故去黄芩。小便不利，故加茯苓。以茯苓，可坚则水愈蓄，故去之。茯苓甘淡渗泄，故加之。

若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝一两，芍药取微汗愈。

又方，人参、甘草、大枣、芍药、桂枝、茯苓、白术、炙甘草。

若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升，干姜二两。

咳者，气逆也。甘则壅气，参、枣所不宜用矣。经曰：肺主皮毛，皮毛受邪，则肺气逆，故以干姜、五味子、芍药、甘草、桂枝、茯苓、白术、炙甘草。

伤寒，阳脉浮，阴脉弦，法当腹中急痛者，先用小建中汤，不差者，与小柴胡汤主之。

又方，人参、甘草、大枣、芍药、桂枝、茯苓、白术、炙甘草。

1. 瓜蒌：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》作“瓜蒌根”。

搜上穴

伤寒五六日中凡，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中痞而不满，或心下痞，或心下悸，或肋下痞硬，小便不利，或不利，身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。

和法，隨症而加減之。

伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，人便溲，脉沉者，此为阴证，必有表，复有里也。脉沉，亦在里也，汗出为阳证。假令脉沉结，不得复有外证，悉入在里。此乃半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病，所以然者，阳不得有汗。今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤。若不了了者，得屎而解。

只有微结者为阳微，其余又为少阴微结。阳微者，以头汗出故耳。少阴象也。而确指为阳微结者，以头汗出故耳。

按：三阴脉，皆至颈胸中而还，不上循头。今既非大汗亡阳之危症，而藏藏于诸阳之会，此明是阳邪不得外越。仲景恐人尚不明白，又设假令纯阴结一层，自难自解，归结于小柴胡汤。盖病症之疑似，必剖晰微芒，每读此等书，必悉心体会，益叹粗工之卤莽造孽也。得

尿而解，当于大柴胡汤酌之，不得复有外症二句，倒装法。

凡柴胡汤证证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，发热汗出而解。

下之，不大便，胃中不和，心下痞硬，头汗出者，因下后里虚也。

本发汗，而复下之，此为逆也。若先发汗，治不为逆。本先下之，而后发汗之，此为逆也。若先下之，此不为逆。

伤寒下利，下重者，先下后发汗，下利自愈。若先发汗，下利不止，反为重也。伤寒下利，下重者，先下后发汗，下利自愈。若先发汗，下利不止，反为重也。伤寒下利，下重者，先下后发汗，下利自愈。若先发汗，下利不止，反为重也。

太阳病，十日以去，脉浮细而数者，外已解也。设胸胁满者，与小柴胡汤。但浮者，与麻黄汤。

伤寒下利，以重者，先下后发汗，下利自愈。若先发汗，下利不止，反为重也。伤寒下利，以重者，先下后发汗，下利自愈。若先发汗，下利不止，反为重也。

伤寒六七日，发汗不解，肢节烦疼，微喘，心下支结，外证未去者，柴胡加桂枝汤^①主之。

本也，发汗不解，肢节烦疼，微喘，心下支结，外证未去者，柴胡加桂枝汤主之。本也，发汗不解，肢节烦疼，微喘，心下支结，外证未去者，柴胡加桂枝汤主之。

① 柴胡加桂枝汤：《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“柴胡桂枝汤”。

此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。

此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。

服柴胡汤已，渴者，属阳明也，以法治之。

此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。

作止六七日，无大热，其人烦躁者，此为阳气入阴故也。

此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。

凡病若发汗，若吐，若下，若利，津液，同病相和者，必自愈。

此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。此乃正邪相搏，邪气入，与正气相搏，结于胁下，邪争于胁下，故往来寒热。休作有时，默默不欲饮食。结于胁下，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。

硝汤主之。

此证用芒硝汤，其证与阳明证相似，但其证在少阳，故用柴胡汤。此证不用大柴胡者，恐伤津液故耳。

柴胡加芒硝汤！

柴胡半斤 人参 甘草 生姜各二两 半夏半升 大枣十二枚
芒硝六两 黄芩一两

水一斗二升，煮六升，去渣，内硝，再煎取三升，先服一升，不解再服。

！ 柴胡加芒硝汤：《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》本方为：柴胡二两十六铢，黄芩一两，人参一两，甘草一两（炙），生姜一两（切），半夏二十铢，大枣四枚（擘），芒硝二两。

太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。

黄芩汤

黄芩二两 芍药 甘草各二两 大枣十二枚

水四升，煮二升，去渣，分温日再服。

黄芩加半夏生姜汤 即与黄芩汤中加二味。

半夏半升 生姜二兩¹

并 病

并病者，一证未解于前，一证复起于后，既非传经之代别也，亦非合病之并见，如身重下利，故曰并病。若见之不透，病之不解，乙证复起于安，圣人或不治其去，大约就不必有转顾所并之经，则有传经诸条、诸方在。

阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不更发。若太阳病前未罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗。设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之、熏之。若发汗不彻不足言，阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人烦躁，不知病处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人脉洪，但坐以汗出不彻故也，更发其汗则愈。何以知汗出不彻？以脉涩故知也。

太阳汗出不彻而转属阳明，微汗不更发，即是汗出既分，然太阳未罢，故不可下而仍言汗，故，色缘缘正赤者，实邪未重，阳气怫郁在表，当解之、熏之，用大下之法，盖汗不过发汗不彻，阳气怫郁之证，不足言汗不得越也。若已汗而汗后，不彻而邪在，故更言汗不彻也，在腹中四肢等证，虽各按之不得，邪犹在之证已。阳气怫郁，即里证之证也。此证不得不更发汗，“更”字当作于声。《白论》曰：太阳中气，伤寒发汗，但下利者，复更发汗数者，可更发汗。然则彼更桂枝汤，此当更桂枝葛根汤矣。

二阳并病，太阳阳明，但发潮热，手足濇濇汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。

人，
不同

太阳与少阴并病，头项强痛，或眩暈，时如结胸，心下硬甚者，当刺大椎第一间、肺俞、肝俞，禁食发汗，汗明谵语，脉弦。五六日谵语不止，当刺期门。

又云：太阳与少阴并病，头项强痛，或眩暈，时如结胸，心下硬甚者，当刺大椎第一间、肺俞、肝俞，禁食发汗，汗明谵语，脉弦。五六日谵语不止，当刺期门。

按：肺俞在背第三椎下两旁，肝俞在九椎下两旁。不能刺而用药，宜柴胡、桂枝、瓜蒌实、柴胡加龙骨汤。

太阳少阴并病，心下硬，头项强痛眩暈者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎勿下之。

又云：太阳与少阴并病，头项强痛眩暈者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎勿下之。

太阳少阴并病而反下之，心下硬，下利不止，水浆不下，其人心烦。

又云：太阳与少阴并病，心下硬，下利不止，水浆不下，其人心烦。

I 而成结胸：《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“而反下之，成结胸”。

两感

若两感于寒者，一日太阳受之，即与少阴俱病，则头痛，口干，烦躁而渴。二日阳明受之，即与太阴俱病，则腹满身热，不欲食，谵语。三日少阴受之，即与厥阴俱病，则耳聋，囊缩而厥，水浆不入，不知人者，六日死。若二阳俱感，五日后两经皆受病，则营卫不行，脏腑不通而死矣。

《伤寒论》曰：太阳与少阴俱病，则反欲得饮，乃大顺也。若太阳与阳明俱病，则反欲得食，乃少阴欲得泄也。若阳明与太阴俱病，则身必重，口难开，欲得温饮，乃大顺也。若少阴与厥阴俱病，则身必重，口难开，欲得温饮，乃大顺也。若两感于寒，则为厥阴邪盛于里也。

《伤寒论》曰：凡两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。若两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。若两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。

《伤寒论》曰：有一阳一阴俱感者，其脉必沉，其证必重，其病必危。若有一阳一阴俱感者，其脉必沉，其证必重，其病必危。若有一阳一阴俱感者，其脉必沉，其证必重，其病必危。

《伤寒论》曰：凡两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。若两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。若两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。

《伤寒论》曰：凡两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。若两感于寒，其脉必沉，其证必重，其病必危。

结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。

此下下大，不可下，下之则死。今入大，而表未全入，里未全实也，下之有不邪聚而正脱者乎？

结胸证具，烦躁者亦死。

此下下大，不可下，下之则死。今入大，而表未全入，里未全实也，下之有不邪聚而正脱者乎？

小陷胸汤，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。

小陷胸汤，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。此下下大，不可下，下之则死。今入大，而表未全入，里未全实也，下之有不邪聚而正脱者乎？

小陷胸汤

黄连一两 半夏半升，洗 瓜蒌实一枚

水六升，先煮瓜蒌，取三升，去渣，内诸药，煮取二升，去渣，分温三服。

此下下大，不可下，下之则死。今入大，而表未全入，里未全实也，下之有不邪聚而正脱者乎？

白散方

桔梗三分 巴豆三分¹，去皮，炒²黑，研如泥 贝母三分

此下下大，不可下，下之则死。今入大，而表未全入，里未全实也，下之有不邪聚而正脱者乎？

1 三分：《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“一分”

2 炒：原文为“砂”，据文义改。

进冷粥一杯

按：结胸症，诚为下早而成，然必邪入，实热与胸中阳气郁结不开，为硬，为痛，方与下。否则上焦为清道至高之分，恐伤元气也。又有不因误下而结者。经云，热已入里，久不攻之，亦至结实，名曰三死一生，是失下也。有汗后，热气传入心下而痞者，是失汗也。《活人》云：若误下了，未成结胸者，争频与理中汤，治中焦故也。有厥症者，兼与四逆汤。戴元礼曰：有热实结胸，更有寒实结胸，虽痛而无烦躁等症。此因下后虚逆，寒气独结，宜理中加枳实半钱，茯苓一钱，或枳实、茯苓、人参、白术、干姜、甘草，六味为末，蜜丸弹子大，每服二丸，热汤化下，连进二三服，即可豁然。或加瓜蒌根，自汗加牡蛎。又有水结胸者，无大热，头微汗出，宜小半夏汤，又有血结胸，手不可近，嗽水不欲咽，喜亡_止如狂，大便秘，小便利，宜犀角地黄汤。此症危险，故采诸说以备急。

痔瘡

“走”，《淮南子》：“是亡楚国之社稷，而不幸吾众也。”
作“脚”，据《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》改。

伤寒发热，下利不解，心下痞硬，呕逆而下利者，大柴胡汤主之。

【按】表邪入里，下利不止，心下痞硬，呕逆而下利者，大柴胡汤主之。此方为六经中治下利之方，其方用柴胡、黄芩、芍药、枳实、大黄、半夏、人参、大枣、甘草，其方用柴胡、黄芩、芍药、枳实、大黄、半夏、人参、大枣、甘草，其方用柴胡、黄芩、芍药、枳实、大黄、半夏、人参、大枣、甘草。

太阳病，发汗后，恶寒发热不解，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴复，复加烧针，因阳竭，面色青黄，脉沉者，难治。今色微黄，手足温者，易愈。

发热恶寒，得于发汗之后。岂汉时即有庸工动以荆、防、桂、枝、麻黄汤治之乎？盖此证者，乃太阳病在表，汗后恶寒，得于发汗之后，恶寒不解，发热不解，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴复，复加烧针，因阳竭，面色青黄，脉沉者，难治。今色微黄，手足温者，易愈。

按：此证由转展误治而剧，类此者十有八九，不服药为中医，谅哉！

大柴胡汤，方用柴胡、黄芩、芍药、枳实、大黄、半夏、人参、大枣、甘草，其方用柴胡、黄芩、芍药、枳实、大黄、半夏、人参、大枣、甘草，其方用柴胡、黄芩、芍药、枳实、大黄、半夏、人参、大枣、甘草。

【按】此证由转展误治而剧，类此者十有八九，不服药为中医，谅哉！

一方，用葱白、生姜、萝卜捣汁，烧热，作二饼，隔绢熨之，亦外治良法。

[illegible]

有之，乃厚而发，于是自利者，多在太阳。太阳当发身黄，若小使自利者，不当发黄。至七八日，云解下利十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。

之候，故不必用他法，听其自止可也。

物也。手足自暖者，是阳气在太阳。太阳者，身首发也。若手足自利者，不能发也。至七八日，大便硬者，为阳明病也。

与邪还于表同意，此为可下之候。

仇者，其脉浮滑者，本欲下也，今反仇者，却四五日，至五六日，转入阳明也，本欲下利者，不可治也。位似大便，而反欠气，仍不利者，属阴也，使必便，十二日愈，所以然者，经尽故也。

2. 在 \mathbb{R}^n 中, 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \cdots & a_{nn} + b_{nn} \end{bmatrix}$.

① 本：原文为“水”，据《伤寒论·辨霍乱脉证并治》改。

大实痛者，桂加大黄汤主之。其人当自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。

桂枝加芍药汤

加芍药二两^①

煎法同前。

大实痛者，桂加大黄汤主之。

大实痛者，桂枝汤证也，大实者，无体上，但引大实证下，在大实之证，桂枝汤去芍药，加芍药，大实，在二证前有力者，痛随利减是也。

桂枝加大黄汤

桂枝加芍药汤中，再加大黄一两^②。

煎法同。

大阴为阳，脉弱，其人当自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。

大阴为阳，脉弱，其人当自便利，故曰胃气弱，其人当自便利，若其人当自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。

① 二两：《伤寒论·辨太阴病脉证并治》作“二两”。

② 一两：《伤寒论·辨太阴病脉证并治》作“二两”。

不得以热与燥疑之。

半夏散及汤 治少阴客寒咽痛。

半夏洗人涎水 甘草¹ 桂枝等分

各等分，合之，白饮和服方寸匕，日三服。此方在《伤寒论》中，以水一升，煎七沸，内散两方寸匕，煎三沸，令小冷，咽之。

少阴病，咽中实，生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。

《伤寒论》中，半夏散及汤，治少阴客寒咽痛，半夏洗人涎水，甘草、桂枝等分，白饮和服方寸匕，日三服。此方在《伤寒论》中，以水一升，煎七沸，内散两方寸匕，煎三沸，令小冷，咽之。

苦酒汤即米醋

半夏破如枣核大，十四枚 鸡子一枚，去黄，内上苦酒著鸡子壳中

上二味，内半夏著苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令三沸，去渣，少少含咽之，不差，更作三剂。

少阴病，二三日，咽干者，可与甘草汤，不差者，与桔梗汤。

甘草汤

甘草二两

水煮汤，温服七合，日二服。

桔梗汤

即甘草汤中加桔梗一两，

桔梗汤：甘草二两，桔梗一两，以水五升，煮取三升，分三服。

1 甘草：《伤寒论·辨少阴病脉证并治》作“炙甘草”。

2 可：此前原有“不”字，据《伤寒论·辨少阴病脉证并治》删。

3 者：《伤寒论·辨少阴病脉证并治》无此字。

自除也。

少阴病，下利便脓血者，桃花汤主之。

少阴病，下利便脓血者，可刺。

少阴病，下利，脉沉者，不可下。脉浮者，可下之。下利，脉沉者，桃花汤主之。

少阴病，下利，脉沉者，不可下。脉浮者，可下之。下利，脉沉者，桃花汤主之。桃花汤，赤石脂一斤，一半全，一半碎，干姜一两，粳米一升，水七升，煮米熟，内石脂末，和匀，每服方寸匕，日三服，愈后勿服。

桃花汤

赤石脂一斤，一半全，一半碎 干姜一两 粳米一升

水七升，煮米熟，内石脂末，和匀，每服方寸匕，日三服，愈后勿服。

少阴病，下利，脉沉者，不可下。脉浮者，可下之。下利，脉沉者，桃花汤主之。

少阴病，下利，脉沉者，不可下。脉浮者，可下之。下利，脉沉者，桃花汤主之。桃花汤，赤石脂一斤，一半全，一半碎，干姜一两，粳米一升，水七升，煮米熟，内石脂末，和匀，每服方寸匕，日三服，愈后勿服。

少阴病，下利，脉沉者，不可下。脉浮者，可下之。下利，脉沉者，桃花汤主之。

少阴病，下利，脉沉者，不可下。脉浮者，可下之。下利，脉沉者，桃花汤主之。

少阴病，下利，脉沉者，不可下。脉浮者，可下之。下利，脉沉者，桃花汤主之。

风寒在表者，一身尽寒，不但背也。背寒有二：一为阴气内盛，故背恶寒，身大热，反欲得近衣者，少阴证也，宜用四逆散；一为阳气不足，故背恶寒，身大寒，欲得近衣者，少阴证也，宜用附子汤。此二证，皆以背恶寒为主，故曰背恶寒者，不可下也。若身大热，反欲得近衣者，少阴证也，宜用四逆散。若身大寒，欲得近衣者，少阴证也，宜用附子汤。此二证，皆以背恶寒为主，故曰背恶寒者，不可下也。

附子汤

附子二枚，去皮，切片 人参二两 白术四两 茯苓三两 芍药二两，酒洗

水煎，去渣，日三服。

身重，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。

身体痛，手足寒，伤寒也。然肾主骨，骨节痛而脉沉，故宜温经以散寒。

身重，脉沉，不可发汗，下阳微也。阳已微，其脉乃沉者，复不可下之。

发汗有明禁，而又咽之者，即附子、麻黄亦不可用也。既不可汗，又不可下，则惟有温经一法而已。

身大寒，反欲得近衣者，不可下也。此证少阴，去当温经而反吐利。

身大热，反欲得近衣者，不可下也。此证少阴，去当温经而反吐利。

身大寒，反欲得近衣者，不可下也。此证少阴，去当温经而反吐利。

身大热，反欲得近衣者，不可下也。此证少阴，去当温经而反吐利。

与胃气，故曰利，以表证未解，不可发汗；又利多因姜。故加之。

少阴病，欲吐不吐，心下硬，但欲寐。五六日自利而渴者，属少阴也。故欲引水自救，若小便色白者，少阴当利悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。

少阴病，欲吐不吐，心下硬，但欲寐。五六日自利而渴者，属少阴也。故欲引水自救，若小便色白者，少阴当利悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。少阴病，欲吐不吐，心下硬，但欲寐。五六日自利而渴者，属少阴也。故欲引水自救，若小便色白者，少阴当利悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。

少阴病，饮食入口即吐，心下微满欲吐，复不吐者，始出之，手足更，脉洪大者，此热也。心下微满，不欲下利，当吐之。若腹上有寒饮，干呕者，亟温之，宜四逆汤。

此条少阴病，欲吐不吐，心下硬，但欲寐。五六日自利而渴者，属少阴也。故欲引水自救，若小便色白者，少阴当利悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。少阴病，欲吐不吐，心下硬，但欲寐。五六日自利而渴者，属少阴也。故欲引水自救，若小便色白者，少阴当利悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。

少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。

脉沉者，邪已深，故宜亟温。

少阴病，下利，白通汤主之。

白通汤

葱白四茎 干姜一两 附子一枚，生，去皮，切

水三升，煮一升，再服。

但下利，无脉者，为无阳之气，故用葱白、附子以通之。

下利，便下重，不可下，不可发汗，不可灸，不可刺，不可温。

少阴病，吐利，手足不逆冷，反发热者，不死。

吐利而不可下者，此反发也，此病条外热而手足者，以其利未止，所以不可下也。然恐其利不止，反下也，反下则少阴者，通经以反阳也。不用温药者，恐伤其阴也。

少阴病，下利，若利自止，恶寒而脉下，手足温者，可治。

利下重者，不可下，不可发汗，不可灸，不可刺，不可温，特脏气虚寒，温之可也。

少阴病，恶寒而脉下，时自烦，欲去衣被者，可治。

恶寒而脉下者，不可下，不可发汗，不可灸，不可刺，不可温，故云可治。

少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦下利，必自愈。

少阴病，脉紧者，不可下，不可发汗，不可灸，不可刺，不可温，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦下利，必自愈。此言其病自愈，以复阳为要也。

少阴中风，阳微阴浮者，为欲愈。

少阴病，阳微阴浮者，不可下，不可发汗，不可灸，不可刺，不可温，故云不可下，不可发汗，不可灸，不可刺，不可温。

少阴病，脉微沉细，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日自利，复烦躁不得卧寐者死。

脉微沉细，但欲卧，少阴病也。汗出不烦，自欲吐，至五六日自利，复烦躁不得卧寐者死。此言其病自愈，以复阳为要也。至五六日自利，复烦躁不得卧寐，此言其病自愈，以复阳为要也。至五六日自利，复烦躁不得卧寐，此言其病自愈，以复阳为要也。

少阴病，吐利烦躁，四逆者死。

与太阳病同，但欲得汗者，不可发汗，发汗则亡阳，亡阳者，身重下利，不可治也。此注其透快。

少阴病，下利止而头眩，时时自冒者死。

下利止，乃真阴尽亡，非阴邪解也。故阴亡于下，则诸阳亦亡，故头眩，时时自冒，此乃阴阳离决，不可治也。此注其透快。

少阴病，恶寒身蜷而利，手足逆冷者，不治。

阴主屈，故蜷，此为阴盛阳微之候。

少阴病，恶寒身蜷而利，手足逆冷者，不治。

此注其透快，不可发汗，发汗则亡阳，亡阳者，身重下利，不可治也。此注其透快。

少阴病，六七日，息高者死。

此注其透快，不可发汗，发汗则亡阳，亡阳者，身重下利，不可治也。此注其透快。

少阴病，何者，无阳则厥，发之，必动其血，未知人何所出，或从口鼻，或从目出，是名下厥上越，为难治。

此注其透快，不可发汗，发汗则亡阳，亡阳者，身重下利，不可治也。此注其透快。

少阴病，咳而下利，甚者，强发其汗，必亡阳，亡阳者，身重下利，不可治也。此注其透快。

此注其透快，不可发汗，发汗则亡阳，亡阳者，身重下利，不可治也。此注其透快。

人，故时人以此条与伏生口授《尚书》相类。曰：之，伤寒发热者，至七日，热必自止，此条与《伤寒论》中“伤寒七日，热自止者，不可下也”相类。盖伤寒七日，热自止者，乃正气胜邪，故热自止。若七日而热不止者，乃邪气胜正，故热不止。此条与《伤寒论》中“伤寒七日，热自止者，不可下也”相类。盖伤寒七日，热自止者，乃正气胜邪，故热自止。若七日而热不止者，乃邪气胜正，故热不止。此条与《伤寒论》中“伤寒七日，热自止者，不可下也”相类。盖伤寒七日，热自止者，乃正气胜邪，故热自止。若七日而热不止者，乃邪气胜正，故热不止。

伤寒论，第五十四，热自止，设六日当复热，不热者自愈，厥终不过五日^②，故知自愈。

此条与《伤寒论》中“伤寒七日，热自止者，不可下也”相类。盖伤寒七日，热自止者，乃正气胜邪，故热自止。若七日而热不止者，乃邪气胜正，故热不止。此条与《伤寒论》中“伤寒七日，热自止者，不可下也”相类。盖伤寒七日，热自止者，乃正气胜邪，故热自止。若七日而热不止者，乃邪气胜正，故热不止。

伤寒先厥，后发热利者，必自愈，见厥复利。

此条与《伤寒论》中“伤寒七日，热自止者，不可下也”相类。盖伤寒七日，热自止者，乃正气胜邪，故热自止。若七日而热不止者，乃邪气胜正，故热不止。此条与《伤寒论》中“伤寒七日，热自止者，不可下也”相类。盖伤寒七日，热自止者，乃正气胜邪，故热自止。若七日而热不止者，乃邪气胜正，故热不止。

伤寒先厥，后发热，下利必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉为痹。发热无汗，利必自止，若不下，必使瘀血，使喉痹者，喉不痹。

① 伏生口授壁经：伏生（生卒年不详）名胜，济南人，经学家，秦代朝廷设博士以备顾问。伏生即为博士。秦始皇焚书，伏生藏《尚书》于壁中。汉文帝时伏生口授《尚书》。

② 厥终不过五日：《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》此后有“以热五日”四字。

脉洪者，不可发汗；脉沉者，不可发汗。脉数与脉洪，皆热证也，以发汗者，反助其热，故不可发汗也。脉沉者，不可发汗，下利者，必致亡阳，亦不可发汗也。故有微汗者，亦自愈，脉紧者，为未解。

下利谵语者，有燥屎也，宜小承气汤。

下利而脉沉者，宜抵当汤下之。下利而脉沉者，非攻其肠也，故不犯厥阴忌下之禁。

呕而发热者，小柴胡汤主之。

下利，脉沉者，宜白朮芍药汤。下利而脉沉者，非耳聩、胁痛之可比。下利而脉沉者，必见烦满、囊缩，非耳聩、胁痛之可比。

下利，身疼痛，宜桂枝汤。下利而身疼痛者，宜桂枝汤。

下利，有身疼痛者，宜桂枝汤。下利而身疼痛者，宜桂枝汤。下利而身疼痛者，宜桂枝汤。下利而身疼痛者，宜桂枝汤。

厥阴病，欲饮水者，少少与之愈。

下利者，不可与米饮。下利而不可与米饮者，不可与米饮。下利而不可与米饮者，不可与米饮。

厥阴中篇¹

伤寒脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁无暂时安者，此为脏厥，不可治也。伤寒脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁无暂时安者，此为脏厥，不可治也。伤寒脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁无暂时安者，此为脏厥，不可治也。

伤寒脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁无暂时安者，此为脏厥，不可治也。

【厥阴中篇：原书目录中缺。

大汗，若大下利而厥冷者，四逆汤主之。

大下利者，大下利也，以四逆汤主之者，是羽毛类也。予亲受其误，故开卷辄拍案痛骂。

吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。

诸症与上条同，而更多吐与发热，安得不用四逆？

吐利汗出，小便复利，亡阳者，下利清谷，里寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。

此条与上条同，但多吐与发热，以是上条下利也。此条下利，下利清谷，下利清谷者，下利也，所以症略同而治异也。

病者手足厥冷，言我不欲言，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。

此条与上条同，但多吐与发热，以是上条下利也。此条下利，下利清谷，下利清谷者，下利也，所以症略同而治异也。

伤寒脉促，手足厥逆者，可灸¹之。

阳内陷而脉短促，故厥逆，灸以通其阳也，宜期门穴。

伤寒六七日，不利，更发热自利，其人汗出不止者死，有阴无阳故也。

六七日者，正邪斗争之时，更发热者，邪盛也。自利者，邪内陷也。汗出不止者，正衰也。正衰邪盛，故死。有阴无阳，故死。

伤寒四五月，腹中痛，若转气下亡小便者，此欲利也。

1 灸：原作“灸”，据《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》改。

下利，脉沉者，下利也。脉沉者，小脉也，以手按之，脉下迫，故知欲利。

下利手足厥冷，无脉者，灸之。不县，若脉不还，反微者，者死。

利，脉沉者，下利也。脉沉者，小脉也，以手按之，脉下迫，故知欲利。则气上逆而阳脱，与少阴息高者死同。

下利后脉绝，手足厥冷，辟时脉还，手足温者生，脉不还者死。

下利脉绝，手足厥冷，辟时有脉还，手足温者生，脉不还者死。下利脉绝，手足厥冷，辟时有脉还，手足温者生，脉不还者死。仍不起者。

伤寒发热，下利厥逆，躁不得卧者死。

肾为肝母，躁不得卧，则肾阴已绝，木立槁矣。

伤寒发热，下利至甚，厥不止者死。

厥不止者，阴邪盛而阳必脱，不待躁也。

发热而厥，七日下利者，为难治。

《易》云：七日来复。不复而反下利，则阳愈剥矣。难治者，宜加意酌治也。

厥阴中风，脉浮为欲愈，不浮为未愈。

厥阴脉本微缓，里痒故也。浮则邪还于表，故曰欲愈。

厥阴下篇

伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不

1 灸之：原作“灸”，无“之”字，据《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》。

2 反：《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》作“反”。

用重剂泄之者，盖恐其势泛滥，祛除不及也。

牡蛎泽泻散

牡蛎^① 泽泻 蜀椒 白术 茯苓 桂枝 桑白皮 葶藶子 各等分
去盐

上八味，各别杵碎，以臼臼之，筛之，内盐，以白蜜和丸，小便利，止后服。

伤寒经水，伤损少气，气逆欲吐者，竹叶石膏汤主之。
伤寒少气，缘以经水伤，故少气，则必有余邪在胃，以
从吐逆者，故以竹叶石膏清胃气，除余热，半夏降逆，人参、
麦冬补虚，甘草、大枣和中，人参和之以代土，七情咸
所宜。

竹叶石膏汤

竹叶二把 石膏一斤 半夏半斤 人参三两^① 甘草炙，二两
粳米半升 麦冬去心，一升

水一斗，煮取六升，去渣，内粳米煮，米熟为汤，去米，
温服一升，日三服。

大烦渴者，喜饮，久不了了，胃上有热，当以丸药温之，
宜理中丸。

与中丸者，以理中丸温中，以散胃中虚寒也。中丸
、理中丸、理中丸、理中丸、理中丸、理中丸、理中丸、理中丸、
不用汤者，丸以缓之也。

病人脉已解，而日暮微烦，以病新瘳，人强与谷，脾胃气
尚亏，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。

上二条，皆言胃气虚，故令微烦，损谷则愈，与人食

① 三两：《伤寒论·辨阴阳易差后劳复病脉证并治》作“二两”。

必成痼疾。况一再汗出，又恐亡阳，宜临时细审。

太阳病，发汗太多，因致痉。

此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。

此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。

丹溪曰：痉属气血虚，有火有痰，宜补而略兼降火，参、芪、芎、归、竹沥之类，切不可作风治。

此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。

此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。

此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。此条与上条同，但上条言“发汗太多”，此条言“发汗太多，因致痉”，盖发汗太多，则津液耗伤，筋脉失养，故致痉也。

与寒之分。盖若无汗，身大热，反欲得近者，乃为虚郁之邪，利之佳。大渴引饮者，或为阳明之热，若身大寒，反欲得近者，则为阳气虚微，利水之药切不可误用。

伤寒之为病，身尽痛，发热，身色如似熏黄。

身大热，反欲得近者，或为阳明之热，或为少阴之虚。若身大寒，反欲得近者，则为阳气虚微。身大热，反欲得近者，乃为虚郁之邪，利之佳。大渴引饮者，或为阳明之热，若身大寒，反欲得近者，则为阳气虚微，利水之药切不可误用。身大热，反欲得近者，乃为虚郁之邪，利之佳。大渴引饮者，或为阳明之热，若身大寒，反欲得近者，则为阳气虚微，利水之药切不可误用。

伤寒，其人但头汗出，背强，欲得被覆向火。若下之早则咽干，口渴，小便不利，舌上如苔者，以津液有热，胸中有寒，渴欲得水而不能饮，则口烦躁也。

伤寒，其人但头汗出，背强，欲得被覆向火。若下之早则咽干，口渴，小便不利，舌上如苔者，以津液有热，胸中有寒，渴欲得水而不能饮，则口烦躁也。此证，上焦有热，下焦有寒，故津液有热，上焦有寒，故欲得被覆向火。若下之早则咽干，口渴，小便不利，舌上如苔者，以津液有热，胸中有寒，渴欲得水而不能饮，则口烦躁也。此证，上焦有热，下焦有寒，故津液有热，上焦有寒，故欲得被覆向火。若下之早则咽干，口渴，小便不利，舌上如苔者，以津液有热，胸中有寒，渴欲得水而不能饮，则口烦躁也。

问曰：伤寒利下，身尽疼痛，去当于利而解，值人阴利不止。医云：此可发汗。汗之药不已者，何也？答曰：发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲汗出者，风湿俱去也。

伤寒利下，身尽疼痛，去当于利而解，值人阴利不止。

《金要略》曰：身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

《金要略》曰：身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

《金要略》曰：身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

《活人》曰：湿温者，两胫逆冷，胸腹满，多汗，头痛安卧，身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

王宇泰曰：昔人治湿温，通身皆润，足冷至膝下，腹满，身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

《金要略》曰：身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

《金要略》曰：身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

《金要略》曰：身重，骨节疼痛，头重，恶寒，无汗，身如被杖，不可屈伸，此名风湿，宜麻黄汤、黄芪防己汤。

浆水散

附子一钱五分 炙甘草一钱五分 芍药一钱五分 黄芩一钱五分 半夏一钱五分 各一钱五分 捣碎 浆水一斗 煮取一斗 服一升 日三服 浆水即醋。

有汗人，宜用此散，但以酒代之，即名风散，宜黄芩解毒合生脉散。

有汗及无汗之人，不可用此二者，若一有汗，稍加附温而行之。

有汗及无汗之人，不可用此二者，若一有汗，稍加附温而行之。

有汗及无汗之人，不可用此二者，若一有汗，稍加附温而行之。

有汗及无汗之人，不可用此二者，若一有汗，稍加附温而行之。

有汗及无汗之人，不可用此二者，若一有汗，稍加附温而行之。

选奇方

羌活 甘草夏生冬炙，各一钱五分 防风 黄芩酒炒，各一钱 水煎温服。

其水伤者，以酒代之，或用水代之，或半酒半水，以温散之。

有汗及无汗之人，不可用此二者，若一有汗，稍加附温而行之。

木瓜一两 茴香二钱半 吴茱萸五钱 炙草二钱

诃子散 治老幼霍乱，一服即效。

白朮 茯苓 炙草 人参 干姜 附子 桂枝 茯苓 良姜 麦芽炒 陈皮 草豆蔻等分

为粗末，每服二钱，温酒下之，水煎，入盐少许服

一方

生姜三两

捣烂，入酒一升，煮三四沸，温服，治转筋。

一方

丁香十四粒

为末，热汤调服。

一方

盐一两 生姜五钱

捣，同炒色变，水煎热服。俱治干霍乱

按：霍乱诸方甚多，此特其略耳。然时下庸工从未之用，并从未之见，所用者，去苓朮之藿香正气而已，尽有三阴症竟用此方，立见

疟

经曰：夏伤于暑，长夏伤于湿，秋必疟疾。盖伤暑则汗出腠开，或当风冷水，使冷之邪，伏于皮肤。一遇秋风，新凉束之，表邪不得外达。阴欲入而阳拒之，阳欲出而阴遏之，阴阳相搏而疟作。或老与在一气，随卫气以为出入，而一日一作。或新与在一气，邪气未得与卫气并出，或可日或三四日作。一作愈迟，愈迟愈深也。然其邪在里表之间，本是少阳界分，所以寒

其色，少气，身重，手足逆冷，脉微而沉，其人面黄肌瘦，
喘而短者，大柴胡汤主之，大柴胡汤即大柴胡汤，一种方名，小
柴胡。

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
白术，寒多加桂。

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
神曲之类。

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
木香、治瘴丸。

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
去桂。

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
行不正之气，真鬼症也，宜平胃散加桃仁、雄黄。

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
鳖甲。

其方名，大柴胡，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，
其方名，大柴胡，大柴胡，其方名，大柴胡，其方名，大柴胡，
小柴胡。

症，提出阴阳之分，水升火降之意。《素问·至真要大论》云：“见夜伏，夜卧昼伏，夜时自发，是无水也。夜色白者，胃中津液，是无火也。无水者，补水之以济其火，六味汤主之。无火，益火之原以消阴翳，八味汤主之。”

《素问》：“凡病久不愈，以在里，邪气内传于里，胃人者，以胃气衰五钱，一钱曰愈，此本经之微也。《素问》：“凡病久不愈，以在里，邪气内传于里，胃人者，以胃气衰五钱，一钱曰愈，此本经之微也。《素问》：“凡病久不愈，以在里，邪气内传于里，胃人者，以胃气衰五钱，一钱曰愈，此本经之微也。”

愚按：疟疾，寻常事也，每秋来或十计或百计。予自幼至今，所历不啻千计，然见方药，不过羌、防、柴、葛、香薷、厚朴、半夏、枳、桔、陈皮数味而已。及门山蒋生，言家中曾有三人患疟，延上洋曹先生诊治，作三方各大异，而三病俱应手即愈。予初疑其有异术，岂知检阅方书，凡表里、阴阳、寒热、虚实，辨析微茫，皆有分辨，即常有应用之药。先圣先贤剧费苦心，昭兹来许。奈何用参、芪，必云风寒未尽，用桂、附，必云暑湿未清。守此柴、葛衣钵，千病一律，以为平稳，而实则杀人。一疟病尔尔，他症尽然，此予悲愤之至，而著此书者也。

清脾饮 治疟疾，以柴胡半钱，黄芩一钱，白术钱半，青皮、厚朴炒、熟半夏、茯苓、草果仁、生姜各一钱，甘草六分，同煎。

柴胡半钱 黄芩一钱 白术钱半 青皮 厚朴炒 熟半夏 茯苓 草果仁 生姜各一钱 甘草六分 同煎。

1. 及门：正式登门拜师受业的弟子。

青皮饮

青皮 厚朴 白术 草果仁 柴胡 茯苓 黄芩 半夏
甘草

寒多加肉桂，热多加黄连。

草果饮 治寒湿有郁滞者，心腹满闷，口苦，舌人饮之。

草果 常山酒炒 知母 乌梅 槟榔 川山甲

原方有甘草，不可与常山同服，去之。

蜀漆散 治牡疟。

蜀漆烧去腥 云母烧三日 龙骨研，水飞

为末，未发前，浆水服五钱。

牡蛎汤 治牡疟。

牡蛎四两，熬 麻黄去节 蜀漆各三两 甘草二两

水八升，先煮麻黄、蜀漆去沫，内诸药，煮二升，温服一升，吐则勿再服。

三解汤

麻黄 柴胡 泽泻

麻黄去节，白芷、白术、芍药、人参、甘草、大枣，用伏半表半里之邪由中而解。

何白芍，一本芍药，一本白芍，与芍药同用。其法：用白芍一两，青皮、陈皮各三钱，甘草一两，生姜二钱，水煎，露一宿，空心温服效。

一方 治久疟。

川山甲 陈皮 槟榔 常山酒炒 吴茱萸各三钱

三味为末，姜汤调服。

景岳休疟饮 此证之治方也。发于疟疾，日久不愈者，服此即愈。

上無所害，故多。上受其害，不，害也，仁而不利者，思多。上利而不，此害也。利者，謂利者為未利，害者為利上，此受其害不死。

挟热下利，芍药汤主之。

芍药汤

芍药一两 归尾 黄芩 黄连各五钱 大黄二两 木香 槟榔 炙草各二钱 桂钱半

每服五钱，水煎服。

[illegible][illegible]

动火，九补之，必于生药中，加一两补药，白九补上七补，一补为一斤，补药中，加一两补药，白九补上七补，除，何嫌何忌而胶执己见。

补、芍、甘草、木香、陈皮、甘草、芍药、甘草以和之，木香、陈皮疏之，每效。

补、芍、甘草、木香、陈皮、甘草、芍药、甘草以和之，木香、陈皮疏之，每效。

补、芍、甘草、木香、陈皮、甘草、芍药、甘草以和之，木香、陈皮疏之，每效。

补、芍、甘草、木香、陈皮、甘草、芍药、甘草以和之，木香、陈皮疏之，每效。

补、芍、甘草、木香、陈皮、甘草、芍药、甘草以和之，木香、陈皮疏之，每效。

补、芍、甘草、木香、陈皮、甘草、芍药、甘草以和之，木香、陈皮疏之，每效。

补、芍、甘草、木香、陈皮、甘草、芍药、甘草以和之，木香、陈皮疏之，每效。

一方 取五谷虫焙末，黄米汤调下，亦效。

清六丸 治血痢神效

六一散一料，加红曲五钱，研细，蒸为丸服

真人养脏汤

人参 白术 当归各六钱 白芍 木香各一两 甘草 肉桂
各八钱 肉果面包煨，半两 御米壳蜜炙，三两 诃子肉一两二钱

每服四钱，水煎服。

五味子丸 治下元虚寒，火不生土，致关门不闭，名曰肾
泄，亦名脾肾泄。

人参 白术制 五味 补骨脂炒，各三两 山药 茯苓各两半
吴茱萸汤泡，炒 川巴戟面包煨 龙骨各一两

共末，酒和丸，每服四五钱，米汤下。

大断丸 治久痢不禁者。

附子 干姜 赤石脂 肉果 甘草 诃子
饴糖为丸，每服三四钱。

十宝汤 治冷痢如鱼脑者，三服立效。

黄芪四两，炙 熟地 白茯苓 人参 归身 白术 制半夏
白芍 五味子各一两 炙草半两

为粗末，每服五钱，加生姜三片，乌梅一枚，水煎服。

气痢神效散

芡实一钱 牛乳半升

煎服

按：芡实，辛热除胃冷，以牛乳煎服，更和血补脾。唐太宗服两
次，俱神验，载在史册。今人绝不知，何也？

加味香连丸

黄连十两，吴茱八两，煎汤，浸透，同炒，去茱 木香一两 槟榔
三两 大黄四两

为末，泛丸，任用。

苍术地榆汤 治受湿血痢，

苍术浸，炒，一两 地榆一两

水煎服。

犀角散 治热痢下血

犀角屑 黄连微炒 地榆各一两 当归半两 木香三钱

为散，每服三钱，水煎服。

洁古加减平胃散

白术 厚朴 陈皮各一两 木香 槟榔各三钱 甘草七钱 桃
仁 人参 黄连 阿胶 茯苓各五钱

每服五钱，姜、枣煎服。

郁金汤 治热毒下血。

犀角屑 黄连微炒 地榆各一两 当归半两 木香三钱

为散，每服三钱，水煎服。

感应丸 冷积久不止者，并可治，虽有巴豆，不令人泻，
其积自然消化，神妙不可言。

南木香 肉果 丁香各五钱 干姜炮，一两 巴豆七十粒，去
皮、心、膜，研，去油 杏仁一百四十粒，去皮尖 百草霜一两

上药并切，同捣，为末，入巴豆，同捣，入木香、肉果、丁香、
干姜、杏仁，同捣，为末，入百草霜，同捣，为末，入油，同煎，
再用清油一两同熬匀，乘热拌药为丸，每服三十丸。

仙传龙宫秘方

茅术七两，米泔浸二日，每日一换清水，洗净去毛，略晒，切片，炒
燥，研极细，取净末四两 草乌三两，去芦、梗，用面一斤，水和，作饼
两个，裹好入瓮糠，火煨焦色，去面切片，晒燥，取末二两 锦纹大黄二
两，切三四块，面包，火煨焦色，去面，切片，炒，取细末二两 川羌活

外治法

五倍子 三钱，碎 明矾末 三钱

水煎，用汁调药末，敷于患处，药末干后，另取桑叶渐渐托上。

一方 熊胆五分 孩儿茶 三分 冰片 一分

作敷药尤妙。

营虚恶寒，然必微而不甚，此所以为春温症也。

微者，脉微也，脉微者，不可发汗，发汗者，病人必亡阳也。弱者发热，脉浮者解之，当汗出愈。

太阳病，下利脉沉者，当微汗出，下利者反快，脉沉者反快，反快者，反快也，反快者，反快也，反快者，反快也。

脉浮热甚，反灸之，此方实，实以虚也，因灸而动，必燥吐血。

浮热甚，邪气实也。伤寒已不可灸，况温病乎？

病如桂枝证，头不痛，脉不强，寸脉微乎，胸中痞硬，气上冲，不得息者，当须吐之，宜瓜蒂散。

又云：病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。

又云：病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。又云：病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。又云：病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。

病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。

又云：病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。

病人身大热，反欲得近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也。病人身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

前是表实里虚，后是表虚里实。

病在阳，应以汗解之，反以冷水渍之，若重渍之，其热被却，不得去，邪更益烦，内上壅起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散。若不渴者，与五苓散。寒实结胸无热证者，与三物小

① 噦（xùn 训）：含在口中而喷出。《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“噦”，二者为异体字。

② 若：或。

③ 却：《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》作“动”。

陷胸汤，白散亦可。

病人脉无他病，时发热自汗出而不愈者，此卫气不和也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤主之。

又云：热自汗出者，此乃营气和。营气和者，外不谐，以卫气不共卫气和谐故耳。以营行脉中，卫行脉外，复发其汗，营卫和则愈。

又云：病人脉洪大，由热也。洪大者，卫气不和，卫气不和，故只用解肌，不可发汗。

病人脉数，数为热，当消谷引食，有反吐者，此以发汗，令阳气微，阴气盛，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

又云：病人脉数，胃中不和，食不化，此以发汗，令阳气微，阴气盛，脉乃数也。数为客热而脉数也，温其胃即愈。

病人耳聋无闻者，以重发汗，虚故也。

此与伤寒少阳邪盛者迥异。见温症禁过汗也。

病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。病人小使不利，大便乍难乍易，时有微热，渴引不能饮者，有燥屎也，宜大承气汤。病人下后五六日不大便，烦不解，腹满痛者，有燥屎也，宜大承气汤。

又云：病人下后，津液内竭，故欲饮水，不可与桂枝，宜与承气汤。病人下后，津液内竭，故欲饮水，不可与桂枝，宜与承气汤。病人下后，津液内竭，故欲饮水，不可与桂枝，宜与承气汤。

凡病若发汗，若吐若下，若亡津液，阴阳和者，必自愈。

又云：冬不藏精，则元气虚者，易愈。伤寒与温病同也。

解肌诸方：

桂枝汤 桂枝加葛根汤 升麻葛根汤 葛根柴胡汤 葛根
葱白汤 葛根黄芩黄连汤

附方 人参败毒散 参苏饮 海藏大羌活汤

《玉函》：「病人、反汗者」者，皆也，乃与甘草汤了治
细，身倦者方可服。

《玉函》：「身重」者，桂枝汤也，乃与人参汤了治

解肌汗出过多，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤。

解肌后，烦渴，脉洪大，白虎加人参汤。

解肌后，腹胀满，厚朴生姜甘草人参汤。

解肌后，不恶寒，但恶热者，调胃承气汤。

解肌后，恶热，无下证，知母石膏汤。

解肌后，脉微数，小便不利，微热烦渴，五苓散。

吐法：

瓜蒂散 栀子豉汤

清热：

白虎汤 白虎加苍术桂枝汤 玄参升麻汤 升麻
子汤 竹叶汤加石膏汤

和解：

小柴胡汤 小柴胡去半夏参枣加人參瓜蒌五味子汤
小柴胡加硝汤

疏风：

荆芥散 独活汤 风引汤 续命汤

分利：

五苓散 猪苓汤 天水散

天水散 牡蛎泽泻散治腰以下有水气

公建中汤 黄芪建中汤 理中汤 治中汤 温中汤

滋阴汤 犀角地黄汤

瓜蒂散

刺鼻出血：

F葉十¹⁾ 箭叶²⁾

卷十

[illegible]

少阳证，始得之，反发热，脉沉者，柴胡为了细辛汤主之。

1. 票干：即甜高粱。

2 義也。即^レ仁也。

则小便不利，直倪失度。①知脏阳但欲，化厚先绝也。②伤寒论云，言犹言也，言在表也，小便利者，可知。③小便所关甚重，竟可误汗、误下而竭其津乎？

少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，紧反去者，为欲解也，虽下利，必自愈。

邪在阴者，真阳退舍，故多下利。④紧脉去而但微，知手足之温为阳气已复，寒邪必从下解矣，故曰自愈。

少阴病，欲吐不得，心烦，但欲寐，五六日自利而渴者，虚故引水自救。⑤口燥舌干而渴，小便色反白者，下焦虚，有寒也，勿认为热以致误。

自利一渴一甚一甚，在手热者，乃小便反白，则心阳但欲寐，显然少阴危重之象。⑥此条形容冬不藏精，易成危肖⑦。

病人脉阴阳俱紧，反汗出，亡阳也，此属少阴，法当恶寒而复吐利。

脉浮汗出，用芍药药无补其汗之也。⑧少阴为水运，汗泄者，亦邪盛而水无制也。此条形容温病更肖。

温经散邪二方：

麻黄附子细辛汤 麻黄附子甘草汤

温经一方：

附子汤 ⑨以中和，清心凉老。⑩身重者，手足重，骨节痛，脉沉者。⑪附子温经散寒，人参补气扶阳，芍药收阴，苓、术制水燠土。

急温一方：

四逆汤 ⑫治邪深入于里者。⑬口有蜜饮，干呕者，身和

① 宛肖：极像。

人里，（原为“下”，依《伤寒论·辨少阴病脉证并治》改）反言“里”，乃其时
无及。

通阳三方：

白通汤 （《伤寒论》卷六） 治少阴病，下利脉微者，故用葱白汤，以
通阳气，姜、附以散阴寒。

白通加猪胆汁汤 （《伤寒论》卷六） 治少阴病，下利脉微者，
服白通汤，利不止者，加猪胆汁，以和之，利自止。此方以猪胆汁
入汤中，以和之，利自止。此方以猪胆汁入汤中，以和之，利自止。
脉微续者生，忌暴出。

通脉四逆汤 （《伤寒论》卷六） 治少阴病，下利脉微者，
身反重者，不可下也。此方以猪胆汁入汤中，以和之，利自止。
脉不出加人参。

温胃二方：

吴茱萸汤 （《伤寒论》卷六） 治少阴病，下利脉微者，
人参、姜、枣助阳补土。

桃花汤 （《伤寒论》卷六） 治少阴病，下利脉微者，
便血者，用桃花汤，以和之，利自止。此方以猪胆汁入汤中，
以和之，利自止。此方以猪胆汁入汤中，以和之，利自止。

温经镇水一方：

真武汤 （《伤寒论》卷六） 治少阴病，下利脉微者，
或呕，或小便利者，皆阴邪盛而水泛之病也。

和阴一方：

黄连阿胶汤 （《伤寒论》卷六） 治少阴病，下利脉微者，
或呕，或小便利者，皆阴邪盛而水泛之病也。

① 尿：原为“尿”，依《伤寒论·辨少阴病脉证并治》改。

其下利和者，一服，至再服，在子午，阿胶、芍药和血以生真阴也。

急下：

大承气汤 如前日病始发，自汗恶寒者，此谓小续命汤之象，宜下以救之。自利恶寒，色青者，此谓中热转属阳明也，承气主之。自汗反恶寒者，此谓阳明也，亦当小下。六七日腹胀不大便者，胃邪实，尤当亟下。

清解：

四逆散 治中微烦，反恶寒者，此少阴不利，反欲中恶，反恶下利者，此微阳从本寒入，故用芍药以和之，枳实散之，以辛和之，柴胡以升散之，以散其郁也。以芍药、甘草、枳实、芍药，皆凡桂枝、小续命利生有禁，反增其利，利下重且难白。

分利：

猪苓散 治下利在里，反重者，此里不得微者。取茯苓、白术、猪苓，分利止利，利止而重自轻，微者可愈矣。然不微精而邪随气化不行者又在所禁。

清咽四方：

甘草汤 **桔梗汤** **半夏汤** **一服即利，热饮**

苦酒汤 治咽中生疮，声不出者。

夏 热

夏至二，夏至日合，和天阳卦。有火热母火，不火火，但火火火者，乃热也。仲夏以白虎为主，主热也。下麦上，内发外，必以和也。故凡病一日，必以有清之辛，乘势升散，知寸之脉来者，少与微之也，中节一服，以清中气，一子午当发。

凡此八证，凡身重者，多因大阳之证，汗后身重，因明
阳证未解，汗后身重，因明阳证未解，汗后身重，因明
以表药汗之，是促其命矣，亟以人参扶其元气。

凡此八证，凡身重者，多因大阳之证，汗后身重，因明
阳证未解，汗后身重，因明阳证未解，汗后身重，因明
去桂枝，加芍药，以和营卫，去桂枝，加芍药，以和营卫，
后用白虎加人参汤。

通解散

麻黄去节 石膏 滑石 黄芩各二两 苍术制，四两 甘草
一两半

为散，每服五钱，水煎服。

葱白香豉汤

连须葱白七根 香豉一合 生姜一片

水煎，日三服，取微似汗，不汗加紫苏。

凡此八证，凡身重者，多因大阳之证，汗后身重，因明
阳证未解，汗后身重，因明阳证未解，汗后身重，因明
杏仁。

在此证，凡身重者，多因大阳之证，汗后身重，因明
阳证未解，汗后身重，因明阳证未解，汗后身重，因明
膈散或承气汤。

在此证，凡身重者，多因大阳之证，汗后身重，因明
阳证未解，汗后身重，因明阳证未解，汗后身重，因明
汤倍石膏。

竹叶石膏汤

竹叶一把 石膏一两六钱 半夏二合 人参二钱 甘草一钱
门冬二钱 粳米二合

水煎，日三服。

之。若邪和氣，內人不大便，宜用竹葉湯吐之，大塚氏。分用芒硝，或調胃承氣下之。

心火，但水有清汁，且起微杨支济。吴氏曰：此由怫郁之热，由心火，与胃火相火合，凡火邪，与胃火相火合，大与一人参化斑，青黛一物汤皆可选用。

阳毒发斑者，其斑红赤下利，身重，咽干，脉洪，已发者，以阳毒升麻汤，大青园化斑汤。凡子仁之炙与可斑已透而谵语便闭，调胃承气下之。

内伤者，先因暑月伤暑，又食不节，胃虚泄处，内外皆热，其斑大者，此暑外有发斑也。若微者，此小者在胃其内作，有微一证，身中微热，脉洪，身重，大便无大热，此内伤也，与阳毒之发斑同治。火毒者，即青黛一物。

阳毒发斑者，亦因脾胃不足，但较少白微红也。此必元气不足，或因感冒内伤，或因暑热入胃，遂成阳毒。伏于于上，无根于寸之尖，脉于寸上微洪，发于皮肤则有斑也，如蚊咬皮也，与阳毒同治，其微者，以阳毒一物。其微者，与阳毒同治，其微者，以阳毒一物。凡治斑症，必细审阴阳虚实，方不误。

升麻葛根汤 治阳毒未出之 若已出者，重下化斑，不可多用升提。以下十七方俱阳证

升麻三钱 葛根 白芍各二钱 炙草一钱

水二盅，煎服。

白芍方 治阴不透者，加芍药二钱；脉洪，加大芍二钱。胃虚食少，加白术二钱。腹痛，倍加白芍。

升麻无舌方 治斑初出，身热，头眩身重，脉不利者。

D 微香：即茴香。

犀角玄参汤 治斑毒，狂言心烦，或咽痛者。

犀角屑 升麻 射干 黄芩 人参 玄参 甘草

大青四物汤

大青一钱五分，如无，以真青黛代之 阿胶 甘草各一钱 淡豆豉一百粒

犀角大青汤 治发斑内实，大便不通者。

犀角屑 大青 玄参 甘草 升麻 黄连 黄芩 黄柏 山梔

当归丸 治发斑内实，大便不通者。

当归五钱 甘草 黄连 大黄各半钱

上药捣碎，以酒浸之，煮取汁，和蜜，服之，每服五十丸，白汤下，以利为度，如不利再服。

黑膏 治时气温毒，斑如锦纹者。

生地黄四两 淡豆豉半升

以酒浸之，煮取汁，和蜜，服之，每服一钱，白汤下，以利为度，如不利再服。

葛根橘皮汤 治发斑内实，大便不通者，服此即止。但呕有清汁者，服此即止。

葛根 橘皮 杏仁去皮尖 知母 黄芩 麻黄去节 炙甘草 炙，各五钱

每服五钱，水煎服。

漏芦连翘汤，治热毒发斑，无汗，大便实者。

漏芦 连翘 黄芩 麻黄 白敛 升麻 甘草各一钱 枳实一钱 大黄三钱

热甚者，加芒硝二钱。水二盅，煎至一盅，下硝，再煎一

二沸，去渣，温服，以利为度，不利再服。

黄连一物汤 治热病发豌豆疮者。

黄连一两

水二盅，煎至一盅，温服。

五物木香汤 治豌豆疮烦疼者。

青木香一钱 麝陆香 丁香 矾石各一钱 麝香半分

水煎，去渣，温服。毒甚，加犀角一钱。

孙兆山梔散 治热毒起于口鼻，发疮如豌豆

牡丹皮 山梔仁 黄芩 大黄 麻黄各二钱五分 木香五分

水煎服。

有口鼻内起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻外起者，用此散吹入，手捻，即愈。

有口鼻内起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻外起者，用此散吹入，手捻，即愈。

一方 用蜜浸升麻涂。

加味三黄石膏汤 治热毒起于口鼻，发疮如豌豆

黄连 黄芩 黄柏 梔子 石膏 知母 升麻 赤芍 玄

参 甘草

加粳米一撮，煎服。毒甚者，加大青、犀角。

有口鼻内起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻外起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻内起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻外起者，用此散吹入，手捻，即愈。

有口鼻内起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻外起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻内起者，用此散吹入，手捻，即愈。有口鼻外起者，用此散吹入，手捻，即愈。

附子散 以下六方俱治内伤寒及阴症

附子炮，七钱 桂心 当归 白术各五钱半夏 干姜各二钱

共为散，姜汤服三钱，覆取微汗，日三服。

阴毒甘草汤

炙甘草 一两 升麻 一两 当归 一两 赤芍药 一两 人参 一两 各切八
鳖甲酥炙，一两

水煎，先服一半，少顷，再进一服，覆取汗，毒从汗解。

通脉四逆汤见前

调中汤

苍术 一钱五分 陈皮 砂仁 藿香 白芍炒 炙甘草 桔梗
半夏 白术 茯苓 木香 丁香 厚朴 枳实 各等分 有板各一
生姜二片

水煎，温服。

大建中汤

当归 白芍 白术 麦冬 黄芪 甘草 肉桂 肉苁蓉
人参 川芎 附子 半夏 熟地 茯苓 生姜 大枣

煎法同前。

人参三白汤

白术 白茯苓 白芍药 人参 生姜三片 大枣二枚

脉沉足冷，加附子。煎法同。

此汤治霍乱吐利，白术、茯苓、芍药、人参、生姜、大枣，各等分，以水一斗，煮取六升，分三服，服后当见汗，汗出即愈。若吐利不止，加附子一枚，以助阳气。若脉沉足冷，加附子一枚，以助阳气。若脉沉足冷，加附子一枚，以助阳气。

王仲弓云：此证以白虎汤为主治，虚者必加人参。

王仲弓云：此证以白虎汤为主治，虚者必加人参。

柴胡清燥汤

白芍 当归 生地 陈皮 甘草 灯心 花粉 知母 柴胡

水煎服。

疫邪传里，停热于胃，无从泄下，其传为里，身自发热，口渴喜冷饮者，曰本证，当胃家移热，必以大柴胡汤攻之。

茵陈蒿汤

茵陈二钱 山栀一钱 大黄五钱 姜三片

水煎服。

邪在阳明，表证已解，食不化，身重不利，小便不利，此邪与痰饮结滞也，宜瓜蒂散吐之。

胡瓜蒂 赤小豆各一钱 生栀子二钱

无瓜蒂，用淡豆豉二钱代。水煎，缓缓作二服。

疫邪留于胃，里气壅滞，下利有臭，曰邪从外解。如元气不壮，下利出不止，内陷少阴，宜托里补虚汤。若脉数，反见身衣被下，此必阳气未伏，本方加大黄一钱，得补发汗者可愈。

举斑汤

白芍 当归各一钱 升麻 柴胡 白芷各七分 穿山甲炙，二钱

水煎服。

疫毒日久入血，利能生水，故夜下数行，其唇干舌燥，此热结旁流也，亟以大承气去其宿垢，自止。

胃移热于下焦气分，小便不利，热结旁流也。若移热于下焦血分，身发斑疹也。其症昼日利减，夜发热、身凉者是，桃仁承气下之，犀角地黄调之。

桃仁承气汤

桃仁十八粒 甘草 芒硝 桂枝各二钱 大黄酒浸，四钱
水煎服。

犀角地黄汤

地黄一两 赤芍 丹皮 犀角镑，各二钱
水煎服。

下后，有微利者，止，复入少许，勿利，以其微利，但少少与之耳。

下后调理，清燥养荣汤。

知母 花粉 当归 白芍 生地 陈皮 甘草 灯心
水煎服。

表有余热，柴胡养荣汤。

柴胡 黄芩 甘草 陈皮 当归 芍药 厚朴 生地 大
黄 枳实 生姜
水煎服。

如有痰饮，胸膈不清者，瓜贝养荣汤。

花粉 贝母 瓜蒌仁 苏子 橘红 白芍 当归 知母
生姜
水煎服。

下后，利止之，最上。一安，花入胃，下利止，若利不止，不能传送，如何可解，宜槟榔顺气汤。

槟榔顺气汤

大黄 厚朴 枳实 槟榔 白芍药 生姜
水煎服。

妇人受病，与男子无异，下后，不与之言，邪不入胃，必入
，下利不止，何以治之，宜小柴胡汤加生地、芍药。

茶一大撮 金汁半盏

水煎，去渣，和金汁，日三次服。

... 柏。便滑，以人中黄代金汁。

人中黄丸

人中黄二两，如无，以坑塆代之。大黄三两，尿浸。苍术麻油炒。桔梗、滑石各二两。人参、川连酒洗。防风各五钱。香附一两五钱，姜汁拌炒。

共末，神曲为丸。气虚，四君子汤送下。血虚，四物汤下。痰甚，二陈汤下。热甚，童便送。每服三钱，日二三服，通用清热解毒汤送。

清热解毒汤

川连、黄芩、白芍俱酒洗。生地、人参各二钱。石膏一两。羌活、知母各二钱。甘草一钱五分。升麻、葛根各一钱。生姜二片。水一斗，煮五升，服一升，日三次服。

疔瘡癰者，发块如瘤，遍身流走，旦发夕死者是也。三棱针刺委中三分，出血，吸服人中黄散。

人中黄一两。辰砂、雄黄透明者，各一钱五分。

共研极细末，薄荷、桔梗汤下二钱，日三次服。

... 散。方载春温卷。

... 白虎汤即白虎汤加苍术二两。方载热病卷。

者，乃有汗也，其人虽在汗中，而脉沉迟者，乃为亡阳也，所以从少阴上冲也。桂枝加桂，所以伐肾邪也。

桂枝加桂汤

桂枝 芍药 生姜各三两 炙甘草 肉桂各二两 大枣十二枚
水七升，微火煮取三升，去渣，适寒温，服一升。

阳有伤也，其脉不弦紧而弱。弱者必渴，被火者，必谵语。弱者发热、脉浮，解之，当汗而愈。

自汗出，恶寒者，虚也。自汗出，恶热者，实也。又火不可发于外，火少则内寒，火多则内热。火少者，脉沉迟；火多者，脉浮数。火少者，当温之；火多者，当清之。升阳散火以解之。

太阳伤寒加温针，必惊也。

太阳伤寒，加温针，必惊也。太阳伤寒，加温针，必惊也。如水热汤沸，鱼有不惊跳者乎？

脉浮者以汗解，用人灸之，邪无从出，因火而盛，病从寒以下必重而痹，名火逆也。

火邪上逆，腰以下皆阴气凝结，故重而痹。

脉浮热甚，反灸之，此为实。实以虚治，因热而动，必咽燥吐血。

脉浮者以汗解，反灸之，邪无从出，因火而盛，病从寒以下必重而痹，名火逆也。

伤寒脉浮，医以火逆劫之，亡阳，必惊狂起卧不安者，桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救急汤主之。

伤寒脉浮，医以火逆劫之，亡阳，必惊狂起卧不安者，桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救急汤主之。

救急汤蜀漆常山苗也

蜀漆一两，洗去腥 牡蛎五两，煅 白龙骨四两，煅，水飞 炙

又云：一妇人，狐惑声哑，多眠，目不闭，恶闻食臭，不直人言，一月间又产五子，与故病同，此与白浊同，治之，各药上有法，以之，一月间又产五子，与故病同，治之，人竹沥、姜汁，饮之，五六服而愈。

治蟹桃仁汤

土艾 桃仁去皮尖，炒 槐子研，各一两 大枣十五枚
水煎服。

黄连犀角汤 治伤寒及诸病后，有蟹出下部者。

黄连五钱 犀角一两 乌梅七个 没药二钱五分
水煎服。

雄黄丸 治下部蟹，与白浊同，治之，各药上有法，以之，一月间又产五子，与故病同，治之，人竹沥、姜汁，饮之，五六服而愈。

雄黄 当归炒，各七钱五分 芦荟二钱五分 槟榔五钱 麝香一钱

共为末，面糊丸，如桐子，每服十五丸，日三服。

雄黄锐 治下部蟹疮。

雄黄 苦参 青梢子 黄连各五钱 桃仁二钱五分

共末，以生艾捣汁为丸，如枣核大，绵包，纳下部。

校注后记

《医方类聚》为朝鲜、华方医学巨著。前人根据《医方类聚》“自序”与“序文”等，推定其成书时间为成化辛巳（1481）“春”，成书地点为1744年，成书时书主72岁，1481年书主1673年，成书时书主72岁。其成书地点为1673—1750？，其确切卒年还有待进一步考证。

《医方类聚》为朝鲜、华方医学巨著，其成书地点为1481年，成书地点为1744年，成书时书主72岁，1481年书主1673年，成书时书主72岁。其成书地点为1673—1750？，其确切卒年还有待进一步考证。

《医方类聚》为朝鲜、华方医学巨著，其成书地点为1481年，成书地点为1744年，成书时书主72岁，1481年书主1673年，成书时书主72岁。其成书地点为1673—1750？，其确切卒年还有待进一步考证。

总 书 目

医 经

内经博议

内经精要

医经津渡

灵枢提要

素问提要

素灵微编

难经直解

内经评文灵枢

内经评文素问

内经素问校证

灵素节要浅注

素问灵枢类纂约注

清儒《内经》校记五种

勿听子俗解八十一难经

黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学寻源

医学阶梯

医学辨正

病机纂要

脏腑性论

校注病机赋

内经运气病释

松菊堂医学溯源

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匱

伤寒大白

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻源

伤寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒撮要

伤寒赘论

医宗承启

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方

伤寒论特解

伤寒论集注（徐亦）

伤寒论集注（熊寿试）

伤寒微旨论

伤寒溯源集

伤寒启蒙集稿

伤寒尚论辨似

伤寒兼证析义

张卿子伤寒论

金匮要略正义

金匮要略直解

高注金匮要略

伤寒论大方图解

伤寒论辨证广注

伤寒活人指掌图

张仲景金匮要略

伤寒六书纂要辨疑

伤寒六经辨证治法

伤寒类书活人总括

订正仲景伤寒论释义

张仲景伤寒原文点精

伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微

玉函经

外诊法

舌鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

脉诀汇辨

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

崔真人脉诀

四诊脉鉴大全

删注脉诀规正

图注脉诀辨真

脉诀刊误集解

重订诊家直诀

人元脉影归指图说

脉诀指掌病式图说

脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸全书

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

推拿广意

传悟灵济录

小儿推拿秘诀

太乙神针心法

针灸素难要旨

杨敬斋针灸全书

本草

药性纂要

药品化义

药理近考

食物本草

见心斋药录

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青囊药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏辑要

本草乘雅半偈

生草药性备要

苗园臆草题药

新刻食鉴本草

类经证治本草

神农本草经赞

神农本经会通

神农本经校注

药性分类主治

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草经雅正

新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

噬斋急应奇方

乾坤生意秘编

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医卒元戎

医家四要

证治要义

松崖医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一骰珠全集

医林口谱六法秘书

温 病

伤寒论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内 科

决镜

内科摘录

证因通考

解围元数

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社疟症论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树惠编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

孕育玄机

妇科玉尺

妇科白辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真诠

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

彤园妇人科

女科百效全书

叶氏女科证治
妇科秘兰全书
宋氏女科撮要
茅氏女科秘方
节斋公胎产医案
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论
幼科折衷
幼科指归
全幼心鉴
保婴全方
保婴撮要
活幼口议
活幼心书
小儿病源方论
幼科医学指南
痘疹活幼心法
新刻幼科百效全书
补要袖珍小儿方论
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科
外科真詮
枕藏外科
外科明隐集
外科集验方
外证医案汇编

外科百效全书
外科活人定本
外科秘授著要
疮疡经验全书
外科心法真驗指掌
片石居瘍科治法辑要

伤 科

伤科方书
接骨全书
跌打大全
全身骨图考正

眼 科

目经大成
目科捷径
眼科启明
眼科要旨
眼科阐微
眼科集成
眼科纂要
银海指南
明目神驗方
银海精微补
医理折衷目科
证治准绳眼科
鸿飞集论眼科
眼科开光易简秘本
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论
咽喉秘集
喉科心法
喉科杓指
喉科枕秘
喉科秘钥
咽喉经验秘传

养 生

易筋经
山居四要
寿世新编
厚生训纂
修龄要指
香奁润色
养生四要
养生类纂
神仙服饵
养生要旨
黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录
胃气论
北行日记
李翁医记
两都医案
医案梦记
医源经旨

沈氏医案
易氏医按
高氏医案
温氏医案
鲁峰医案
赖氏脉案
瞻山医案
旧德堂医案
医论三十篇
医学穷源集
吴门治验录
沈芊绿医案
诊余举隅录
得心集医案
程原仲医案
心太平轩医案
东皋草堂医案
冰壑老人医案
芷园臆草存案
陆氏三世医验
罗谦甫治验案
周慎斋医案稿
临证医案笔记
丁授堂先生医案
张梦庐先生医案
养性轩临证医案
养新堂医论读本
祝茹穹先生医印
谦益斋外科医案
太医局诸科程文格

古今医家经论汇编

莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志

医学读书附志

综

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

杏苑生春

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真詮

活人心法（刘以仁）

家藏蒙筌

必用指南

普济法医约

嵩厓尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

寿身小补家藏

胡文煥医书三种

铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物考

汉阳叶氏丛刻医集二种



责任编辑 伊丽紫
封面设计 古 骥

内容提要

《伤寒正医录》由清代邵成平（字庸济）撰，成书于清乾隆九年（1744）。凡十卷。卷一详述脉象及常见证候的辨证要点，卷二至卷四分别论述太阳病、阳明病和少阳病，卷五为合病、并病、两感、结胸、脏结、痞、卷六至卷八分别为太阴病、少阴病和厥阴病，卷九为劳复、食复、阴阳易、瘧病、湿病、喝病、暑病、霍乱、疟、痢，卷十为春温、夏热、发斑、疫、火劫、狐惑。本书内容丰富，不仅对《伤寒论》原文加以串讲，融会贯通，而且多加阐发，见解独特。本次整理以乾隆九年（1744）三当轩刻本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-3032-2



定价：55.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号
(zgxyybs)



中医出版
(zhongyichuban)



养生正道
(yszhongdao)



悦读中医
(ydzhongyi)